

河南中药手册

第一册

河南省卫生厅藥品檢驗所編

河南人民出版社



66.91
312
1:

前 言

祖国医药学有着悠久的历史，乃是世界上一个伟大的宝库，内容丰富多采，是我国劳动人民几千年与疾病做斗争的经验总结，是祖国文化遗产重要的组成部分。

中医与中药是不可分割的有机整体，中药是中医治疗疾病的主要武器，没有药就难以把一些疾病治好。

河南自古以来是我国的药材主要产区之一，不但产的品种多，而且质量较好，在国内国际市场很有声誉。不论在药材加工，药材鉴别，药材经营等方面均具有丰富的经验。

我们为了全面继承这些宝贵的经验，在卫生厅，商业厅的直接领导下，卫生部药检所的帮助和郑州市中药材公司、河南医药专科学校的大力协助下，首先组织郑州市中药材界老师傅，对中药诸品种进行座谈，然后分赴河南各主要产药区，对座谈材料进行较广泛的征求意见，最后进行删节，补充，更正和定稿。

我们编辑这本书的目的，是希望通过它，能对进一步研究整理中医中药提供参考资料，对河南各地药材加工生产、收购，使用及教学工作有所帮助。

由于编写时间较仓促，又缺乏编写经验，因而错误和缺点可能不少，希读者多多提出意见和批评，以便再版时更正，补充。

河南省卫生厅药品检验所

一九五九年二月



中科院植物所图书馆



S0022926



目 錄

二 划

十大功劳..... (1)

三 划

三稜..... (2)

土元..... (2)

土龙骨..... (3)

土貝母..... (4)

大枣..... (5)

大薊..... (5)

大青叶..... (6)

小薊..... (7)

小茴香..... (7)

女貞子..... (8)

千金子..... (8)

上甲..... (9)

山藥..... (10)

山查..... (13)

山茱萸..... (14)

山豆根..... (15)

山大黃..... (16)

山天麻..... (17)

山沙參..... (18)

山川柳..... (18)

山胆草..... (19)

山枸杞..... (20)

干漆..... (20)

四 划

五味子..... (21)

五倍子..... (22)

五加皮..... (23)

五灵脂..... (23)

升麻..... (25)

天南星..... (25)

天門冬..... (26)

天麻..... (27)

天仙子..... (28)

天仙藤..... (29)

水蛭..... (29)

月季花..... (30)

木通..... (30)

木槿花..... (31)

木瓜..... (31)

牛黃..... (32)

牛膝..... (34)

牛蒡子..... (36)

王不留行.....	(36)
毛桃.....	(37)
丹参.....	(37)
火麻仁.....	(38)
六神麩.....	(39)

五 划

白前.....	(40)
白夫子.....	(41)
白芷.....	(41)
白芥子.....	(42)
白果.....	(43)
白蒺藜.....	(44)
白凡豆.....	(44)
白藓皮.....	(45)
白薇.....	(45)
白芨.....	(46)
白头翁.....	(47)
白欬.....	(47)
白茅根.....	(48)
石膏.....	(49)
石楠藤.....	(50)
石榴皮.....	(51)
冬瓜子.....	(51)
冬葵子.....	(52)
冬瓜皮.....	(52)

半夏.....	(53)
半夏麩.....	(53)
代赭石.....	(54)
北沙参.....	(55)
甘遂.....	(56)
生地.....	(57)
生姜.....	(60)
玉竹.....	(61)

六 划

全虫(蝎).....	(61)
地肤子.....	(66)
地丁.....	(66)
地骨皮.....	(67)
地榆.....	(68)
地龙.....	(68)
百合.....	(69)
百部.....	(69)
百草霜.....	(70)
光慈姑.....	(71)
竹茹.....	(71)
艾叶.....	(72)

七 划

車前子.....	(72)
决明子.....	(73)
赤石脂.....	(73)

辛夷..... (74)
 芒硝..... (75)
 防风..... (75)
 谷精草..... (76)
 旱蓮草..... (77)
 皂角..... (77)
 皂角刺..... (78)
 杜仲..... (79)
 何首烏..... (79)
 芍藥..... (80)

佩兰..... (92)
 知母..... (93)
 羌花..... (94)
 花椒..... (95)
 花粉(天花粉)..... (96)
 芡实..... (97)
 狗脊..... (98)
 狗宝..... (98)
 卷柏..... (99)
 芙蓉叶..... (100)

八 划

九 划

夜明砂..... (82)
 夜交藤..... (82)
 刺猬皮..... (83)
 阿胶..... (84)
 青黛..... (85)
 青箱子..... (86)
 青木香..... (87)
 青风藤..... (88)
 青蒿..... (88)
 金釵..... (89)
 金銀藤..... (90)
 金櫻子..... (90)
 金蒙石..... (91)
 蘆苈子..... (91)
 蘆根..... (92)

柿蒂..... (100)
 威灵仙..... (101)
 独活..... (102)
 柴胡..... (103)
 柏子仁..... (103)
 故子(补骨脂)..... (104)
 紅花..... (105)
 紅娘子..... (107)
 紅要子..... (107)
 苦杏仁..... (108)
 苦丁香..... (109)
 苦楝子..... (109)
 苦楝皮..... (110)
 苦参..... (111)
 香薷..... (111)

香薷.....	(112)	烏梅.....	(131)
香附.....	(113)	夏枯草.....	(132)
急性子.....	(114)	芫蔚子.....	(133)
虻虫.....	(114)	茵陈.....	(133)
洋金花.....	(115)	浮萍草.....	(134)
禹粮石.....	(116)	益母草.....	(134)
扁豆.....	(116)	透骨草.....	(135)
扁豆花.....	(117)	馬勃.....	(136)

十 划

桔梗.....	(118)
桃仁.....	(119)
馬兜令.....	(120)
荆芥(附荆芥穗).....	(120)
茯苓.....	(121)
豹骨.....	(123)
海桐皮(附丁皮).....	(124)
秦皮.....	(125)
桑叶.....	(125)
桑白皮.....	(126)
桑寄生.....	(127)
桑枝.....	(127)
茜草.....	(128)
狼毒.....	(129)
射干.....	(129)
草烏.....	(130)
党参.....	(131)

十一 划

牵牛子.....	(136)
連翹.....	(137)
紫苏子.....	(138)
紫苏叶.....	(139)
紫苏梗.....	(140)
紫河車.....	(140)
紫稍花.....	(141)
紫荆皮.....	(142)
紫草.....	(142)
蛇蛻.....	(143)
野猪皮.....	(144)
阴起石.....	(144)
蛇床子.....	(145)
甜瓜子.....	(145)
荷叶.....	(146)
側柏叶.....	(146)
淡竹叶.....	(147)

淡豆豉	(148)
貫眾	(149)
望月沙	(149)
猪苓	(150)
淫羊藿	(150)
通草	(151)
旋复花	(152)
密蒙花	(152)
梔子	(153)
梭罗子	(154)
麦門冬	(154)
麦芽	(155)
細辛	(155)
商陸	(156)

十二划

菖蒲	(157)
菟絲子	(158)
萊菔子	(158)
琥珀	(159)
款冬花	(160)
菊花	(161)
黄丹	(162)
黄腊	(163)
黄柏	(163)
黄精	(164)
黄芩	(165)

黑芝麻	(166)
黑桑椹	(167)
猫爪草	(167)
硫黄	(168)
寒水石	(169)
阳起石	(169)
斑蝥	(170)
絲瓜絡	(171)
寻骨风	(171)

十三划

韭菜子	(172)
鷄肉金	(173)
鷄血藤	(173)
鷄冠花	(174)
楮实子	(175)
葛根	(175)
葛花	(176)
葶藶子	(176)
蜜蜂	(177)
蜂房	(178)
蜈蚣	(179)
路路通	(180)
葱籽	(181)
蔞蓄	(181)
礪砂	(182)
远志	(183)

十四划

酸枣仁.....	(184)
漏蘆.....	(185)
蒼朮.....	(186)
蒼耳子.....	(187)
槐角.....	(187)
槐花(附槐米).....	(187)
蒲公英.....	(188)
蒲黃.....	(189)
蓖麻子.....	(189)
墓頭回.....	(190)
豨薟草.....	(190)
銅綠.....	(191)
刘寄奴.....	(192)

十五划

銀花.....	(193)
銀杏叶.....	(194)
蓮子.....	(195)
蓮房.....	(195)
蔓荊子.....	(196)
磁石.....	(197)

十六划

澤兰.....	(197)
---------	-------

十七划

薄荷.....	(198)
龙骨.....	(199)
龙齿.....	(200)
薏苡仁.....	(201)

十八划

瞿麦.....	(202)
翻白草.....	(203)
蝉衣.....	(203)
鵝不食草.....	(204)

十九划

藜蘆.....	(204)
---------	-------

二十划

麝香.....	(205)
鶴虱.....	(207)

二十一划

蚤沙.....	(208)
---------	-------

十大功劳

别名：功劳叶，

产地：主产于信阳专区。

产季：秋季九、十月间产新。

产地加工：秋后采下叶，晒干即成。

商品规格：不分等级，以色灰绿，肥厚、叶大、光亮，干净，并以不碎为佳。

鉴别方法：本品为广卵形或卵状矩圆形的灰绿色的叶子，（叶柄向上看之略似寺庙的钟形），叶边有4—10个尖刺（多数为6—8个）。叶革质，坚硬，上表面光亮，下表面无光泽，叶边向下卷曲。

用途：①清凉性滋养强壮药、适用于结核性潮热。

②治肺癆、止咳、化痰、退虚热、杀虫。

包装：装大竹筐，防压碎。

贮藏：防潮，宜放在干燥处（吃潮变黑）。

其他：新货绿色，质量好，放年久，以陈叶颜色变淡。

注：本手册所用时间，皆按农历计算。

三 划

三 稜

• 別 名：京三稜。

產 地：西平、遂平、輝县、长葛等县境内，均生于水溝边。

產 季：八、九月产新。

產地加工：秋后，下水拔出根部，洗净泥土，趁湿削去外皮及須根，（呈黄白色）晒干，即可。

商品规格：以个大，身干，色灰白，質坚，皮削得干净无毛的为好。

鑑別方法：本品为三稜的地下部分（块茎）外观为稍扁的长卵园形块状，上面有疙瘩，頂部稍尖，内外皆为黄白色，質坚硬。味苦。

用 途：开积、破血、通經、催乳、治子宫血肿、产后腹痛，月經閉止。

包 装：麻袋。

貯 藏：乾燥保存。

土 元

別 名：老婆虫土鼈。

產地：主产于南阳、信阳、許昌、新乡等专区，郑州亦产。

產季：五——九月間为捕捉期，而以六——七月产的較多。

產地加工：晚上带灯在草灰潮湿地用手扑捉，扑捉后（活的）如不干淨，就用清水洗淨，煮时先把盐水（每斤加二两盐）煮半开，然后再下鍋煮1~2小时，煮后掏起晒干即成。

商品規格：不分等級，以身干个勻不碎（全边者）为佳。

鑑別方法：本品为昆虫类，以土鳖的干燥品入藥，虫体扁平，长寸許，头細小前窄后闊，背有橫紋錯起，質状硬壳触角綫状生于头顶兩側，足三对长短相等，色紫黑而亮，身体大小不等。

用途：壮筋骨、治腰痛、消淤血、专做通經藥。

包裝：装箱子（30~40斤上下）。

貯藏：防潮（吸潮后生花点、生虫），防鼠咬。

其他：①紅花、土元以酒浸之，可代碘酒使用。

②苏土元与土元之区别：

苏土元个小体厚，呈园形，色紅（紅肚子）
土鼈（元）：体較扁且薄，飞边亦大，黑肚子。

③有翅的不能入藥（俗称打灯蛾）。

土 龍 骨

產地：河南各地都产，多产于有山有水的地方，以洛阳专区、蘆氏、灵宝、南阳专区西峡产的多。

產季：无一定产期。

產地加工：土龙骨是动物的化石，但没有龙骨年代那样

久，比龙骨易得，掘出后去淨泥土即成。

商品規格：不分等級，以无土无泥，不夾帶石头的为好。

鑑別方法：土龙骨也是古代动物的化石，从其外形看石化程度不如龙骨，动物的軀体也不比龙骨动物高大，是黄白或灰白色的骨状化石，多呈半管状或片状碎块，內面多帶毛孔，但折断的骨茬，質較堅而脆，很似破碎的瓦块、也有吸舌性（吸水性）但不如龙骨吸力大。

用 途：斂心神、固精燥濕，強止血藥（甚效）

包 裝：麻包。

貯 藏：干燥、保存。

土 貝 母

產 地：主产于信陽、南陽、禹縣、長葛各地，过去都是家种，現不种植。

產 季：八、九月間产。

產地加工：秋后回秧（枯）时，挖出根茎，洗去泥土晒干即成。

商品規格：不分等級，以个大，棕紅色，不发黑的为好。年久发黑有裂縫則次。

鑑別方法：本品为土貝母的地下部分是不規則的块茎。呈心脏形。色紅黑，質堅硬，断面发亮似阿膠，入口甚粘。

用 途：除風濕，化膿毒，利痰，行帶，斂瘡口。

包 裝：麻袋。

貯 藏：干燥防虫。

大 枣

產地：主产在新郑县（俗称新郑枣），灵宝县也产。

產季：白露以后。

產地加工：枣子成熟后打下，放在砂地上晒三四日成半乾（雨天盖席防雨），然后移于高粱秸所制的箔上，随时以扒子翻动晒到全乾即成。

商品規格：不分等級，以不霉，不烂为佳。

鑑別方法：本品是枣树的成熟果实呈暗紅色，为长椭圆形之核果，加工之后皮皺縮色变深河南地区习惯分为：

新郑枣：个小体长，核小、肉厚、离核、味甜而不酸，核稍弯曲，晒乾后肉气大，体軟不乾，紫紅色，个匀，长圆形。

灵宝枣：个大，核大，質泡，肉薄，不离核，味不甜帶酸味。干后个大体圆，肉气稍次。

用 途：①健脾調理荣卫的功效和生姜同服能生脾胃之气。

②潤心肺，补五脏，有鎮靜作用。

包 装：新麻袋（防損失）

貯 藏：过夏易生虫霉烂。枣囤中放一开口酒瓶（上盖布），即可防虫防腐。

其 他：外省产品：晒干后紅色，肉气小，多呈干癟状。

大 薊

別 名：刺角牙；

產地：河南各地都產。

產季：夏末芒種前採集。

產地加工：採集後曬干即成。採集時要適當，不要過老或過嫩，在花未開時，採之最好，其根不入藥，花也不用，主要用葉與莖。

商品規格：不分等級，以無根，無大花，葉莖綠色無雜的為好。

鑑別方法：本品是地上全秧，株長1尺左右，葉對生，長條形，周圍有尖刺，鮮時綠色，干後灰綠色。

用途：止血，利尿，涼血消腫，清熱解毒。

包裝：席包。

貯藏：置干燥，通風處，防潮。

其他：入藥時，炒黑止血，生用涼血。嫩時作菜吃。

大 青 葉

別名：板藍根葉。

產地：主產於信陽、新鄉等專區，野生。

產季：六——七月。

產地加工：割下後，立即曬干，即可。

商品規格：不分等級，以不霉爛，青黑色為佳。

鑑別方法：本品以葉子供藥用，葉呈長圓形，較柳葉稍寬，干品皺縮，成不規則形，青黑色，質脆易碎，葉柄為黃綠色。

用途：清涼解熱，介毒藥，用於斑疹傷寒、扁桃腺炎、急性喉頭痛、及各種傳染性的熱病，如中毒、猩紅熱等。

包裝：席包。

貯藏：防潮。

小 薊

別名：曲曲菜。

產地：河南各地均產，近河地帶，低窪地均生長。

產季：春夏二季採集苗葉入藥，春採者佳。

產地加工：採集後，用水洗淨泥土，曬干即成。

商品規格：不分等級，曬干後呈灰綠色，以整齊肥大無雜的為好。

鑑別方法：本品入藥是地上全稜，稜長約3—5寸，葉嫩無刺。

用途：清熱解毒，涼血消腫，止血利尿，嫩時可作菜食用。

包裝：席包。

貯藏：防潮。

小 茴 香

產地：河南各地均產家種。

產季：八、九月採籽。

產地加工：八、九月間收割後，曬干，碾去枝葉即成。

商品規格：子肥大，飽滿青綠色，無土為佳，陳貨即發黃。

鑑別方法：本品為青綠色（黃綠色）之小長籽（雙懸果）有兩瓣，每瓣中間（分果）有二三道直紋，研開有香氣，全長約為1.5分，直徑5厘左右。

用途：健胃驅風藥，有祛痰催乳之效。適用於胃腸疝

痛，鼓腸，腹膨等症。

包裝：用麻袋（100—200斤。）

貯藏：防潮，置干燥通风处。

其他：①其杆也能入藥。

②西小茴：色发綠，香味重，大小不均匀，不整齐，帶有土。

女 貞 子

別名：冬青子。

產地：南阳专区，內乡、鎮平，洛阳专区的嵩县及信阳专区。

產季：秋季霜降以后。

產地加工：采下晒干即成。

商品規格：以色黑不发黄飽滿的为好。

鑑別方法：本品为类园形的种子，上端圓，黑色，內棕黄色体上有皺縮的凹紋与鴨胆子相似，但鴨胆子內白，仁小，皮青黄色，也有黑色很苦，而本品皮黑肉棕不苦为其特点。

用途：强阴健腰膝、明耳目、烏髭鬚、补风虛。

包裝：麻袋装（100—200斤）。

貯藏：干燥通风处保存。

其他：不生虫，用时搗碎。

千 金 子

別名：續随子。

產地：河南各地都产。以禹县、溫县、孟县为主产

地。都是家种。

產 季：八月种麦时下种，第二年割麦时成熟（陈子种后不出）。

產地加工：成熟后連秧割下、晒干，在場地上以棍棒或叉子打下，扇去皮杂，即成。

商品規格：不分等級，以个大淨貨、无土、无杂者为佳。

鑑別方法：本品是灰黑色种子。橢圓形稍扁，大小如赤小豆。一头圓形稍粗，一头稍細是齐头（是一斜面），外皮皺縮現灰色花紋，皮薄質脆。內有亮白色种仁，油性很大（手压之可挤出透明油脂）。（有毒）

用 途：利尿、峻下剂治水肿又为通經藥。下水破血攻积聚，散痰飲，逐恶滯物。

包 装：麻袋（100斤下）。

貯 藏：防潮。

其 他：①植物秧高一尺多，叶为三尖形，熟时果实似豌豆角，稍細。

②温、孟两县产品較好，个大貨淨不带壳。

上 甲

別 名：鰲甲、鰲盖。

產 地：主产于信阳专区的商城、固始、光山、罗山。南阳专区的泌阳也产。

產 季：四季都产，春夏产量最多。

產地加工：捕捉后把鰲头剥下，然后将鰲放于沸水內煮一小時左右，取出去掉残肉，然后埋在土里（7~8天）使肉全烂掉，晒干后即成鰲甲

商品規格：分：毛貨（帶肉的）和清水貨（不帶肉的）二種。以除淨背上的殘肉，個勻整不碎，內面白色的為好。

鑑別方法：本品為鰲之背甲，體呈橢圓形，背面青黑色，有橫紋及麻點，內面白色有脊椎骨及8對肋骨，質堅硬。死鰲的上甲邊緣沒有刺。

用 途：消食、滋陰、補腎。

包 裝：席包。

貯 藏：放乾燥通風處，防止潮濕。

山 藥

別 名：菜山藥、白皮山藥（均指鮮山藥而言）

產 地：新鄉專區的溫縣、武陟、博愛三縣為主產地。

產 季：清明後谷雨前下種，來年正月出新（現改為冬臘月出新）。

產地加工：山藥出土前先拉去秧，收起山藥蛋（可作種或食用），出土時先在一邊挖一深溝（2~3尺深），而後順序挖取山藥，隨出土立即去淨外部泥土，折掉上部的籠頭（長5~6寸）作為明年種子（此種不夠用時，可將栽種一年後的山藥蛋補充）折斷後的下段即稱鮮山藥。下步加工方法可分以下三段：

1. 鮮山藥加工成毛山藥：取鮮山藥放水內泡2~3小時取出用竹刀（用母指粗的竹杆削去一小半而成）刮掉紅皮，放竹篾內薰之，每篾鮮山藥約一百五十斤上下，用硫磺一斤。薰的辦法：地上挖一個小坑約八寸到一尺深，地面上四角放磚八塊，將竹篾墊起，將硫磺燈放坑內點着，上邊用無底大木箱蓋住，四邊用土圍嚴，有一處少留縫（使硫磺燃燒），硫磺着完為止。

薰后将山藥放另一篋中擗（即放置室內）二天、晒一天，如此反复，擗晒約四、五次即可晒干。晒干后即為毛山藥。擗的道理是防止將外皮晒干，不能使全部水分散出。擗時每天早晚要倒篋一次，使水分易擗出。

2. 毛山藥加工成光山藥：將毛山藥放水中泡一天（二十四小時）浸至无干心為止，取出后用水洗去泥土，放篋內擗（边加热边悶）十二小時，使身軟如棉，置薄上晒一天，直到山藥本身出白霜為止，而后拾放篋內，如上法用硫磺再薰一次（每篋用硫磺半斤），薰后放缸內擗两天（防干）使干濕均匀，而后取出放梨木案板上，用梨木板（長一尺至一尺二寸，寬四寸，板背有一手持斜把）搓平溝槽，此為頭遍，晒兩小時后重放缸內擗之，約一天，取出再搓，同時用刀將兩端切齊，然后根据長短不同，切成長6~7寸或4~5寸長的段，再以刀削去不平的疙瘩，使身道平直通順。再搓第二遍，搓時右手持板，左手的中指頂住山藥一頭，使被搓轉，同時兩手向內推，并不時立起按壓，使由細壓粗、搓圓，而光滑。放薄上晒干即為光山藥（俗稱黑粘轆），晒時如日光過強應蓋以布單防晒出裂口。

3. 加工廠加工：取黑粘轆在水中少粘一下，用洋鉄皮割去外層，再用銅羅底打光，然后立于銼上，將頭銼齊。以粗細不同分為不同等級，放入拔板內，拔為不同長度的山藥，進行裝箱。

商品規格：成品山藥依其粗細不同分為以下幾種規格：

規格：把2、把3、把4、把5、把6、把7、把8、把9、把10。

直徑：1寸，9分，7.5分，6.5分，6分，5.5分，5.3分，5分，4.5分。

把2、即大母指與中間對握兩支者，余类推。把10以下稱

为小貨。长短以4寸长为合格，不足4寸者按原規格去价5%。足4指长者按小貨計算，不足4指长者为冷节。成品山藥一般以粗細均匀，粉气足，質重、光滑、洁白无斑痕的为好。

毛山藥是未經加工搓圓的山藥，多用小貨或次貨制成。以个大，粉气足，抽溝少者为佳。

另外，有冷节（折断的光山藥或黑粘糖），山藥头（加工时切下的切头）及削片（圓搓前削下的山藥片）。

鑑別方法：本品用其地下部份成品山藥（亦可称光山藥）是光滑洁白，粗細均匀的长圓柱体，长4~7寸，粗者可达1寸以上。

毛山藥是未經加工修整的去皮山藥，外形不一，多为扁圓形略弯曲的柱状体，灰白色或黄白色。

另外“牛筋山藥”是經水泡或生于濕地而生虫的山藥。也將外皮去掉，色棕黄，有的带紅色，質坚硬，不易折断或打碎，外形很似牛筋，本品色发黑，質坚硬的不能入藥。

用 途：平补、健脾。

貯 藏：防潮、防虫（受潮易生虫）、防霉烂、发霉后可用刷子刷去霉再以硫磺薰之，薰后色仍变白。

包 装：光山藥出口多装木箱，內襯油紙，外塗血料，箱外再加席包。其装箱方法有不同要求与規定（詳見下表），小中箱都是頂底一样，粗細相同，但长短有別，大中箱是好貨裝于口面，次貨夹于箱內。較次的光山藥也有装籃的。

裝箱規格一覽表

(本表仅供有关單位參考)

重量 支別	箱別	小 中 箱				大 中 箱		光山筭
		6支	7支	8支	9支	12支	14支	
把2		135斤						
把3			135斤					
把4				135斤				
把5					135斤	22斤		
把6							22斤	20斤
把7						108斤		30斤
把8						20斤	30斤	30斤
把9						23斤	90斤	30斤
把10							22斤	30斤
把10以下							51斤	45斤
合 計		135斤	135斤	135斤	135斤	175斤	185斤	185斤

(1) 6支，指按箱面寬平放6支之箱，余类推。

(2) 各類箱均有一定尺寸；小中箱，寬5.6寸，長2.4尺，高2尺，大中箱12支箱，高2尺、長2.4尺、寬7.2寸，大中箱14支箱，高2尺、長2.4尺、寬8寸。上述尺寸均以內徑計算。

山 查

別 名：東查、南查、山里紅、山梨果、莫河梨。

產 地：東查主产于新乡专区、輝县產量最多，家種。南查主产于信阳等及南阳专区是野生。

產 季：九月採實。

產地加工：采取成熟的果实切横片（二刀三片），晒干即成。

商品規格：以紅色无虫、肉厚的为佳。以产地不同分为：
东查：片大，多是二刀三片。

南查：多是一刀两半或是整个的。无肉气，質量次。

鑑別方法：本品为干燥的圓球形果实，表面暗紅黄色，有斑点，內部白色，种子4~6个，質坚硬色黑，藥用多作成切片味酸。

用 途：消食开胃，能发小兒痘疹。

包 装：席包、麻袋。

貯 藏：防潮、防虫。

其 他：

①东查：过去是指山东产品而言，山东的东查个大片薄。肉厚黄白茬，多是四刀五片貨。

②河南产的东查与南查質量均不如山东产的东查其規格質量如上項。

山 茱 萸

別 名：萸肉、山萸肉、枣皮。

產 地：主产于南阳专区（內乡县的馬山口）和洛阳专区的嵩县、欒川、新乡专区的济源，开封专区巩县，集散地为洛阳及馬山口。

產 季：秋后九月产新。

產地加工：果实成熟时鮮紅色，成熟以后以手攪下，放鍋中，以沸水煮熟（否則不易去核）取出，趁濕以手捏出內核，取其皮（果皮）晒干即成。

商品規格：不分等級，以片大、肉厚、无核、无杂的为佳。

鑑別方法：本品是紫紅色抽皺的果皮長約5分、寬約2—3分。質柔軟潤性發粘，表面有很多皺紋與壓折，微透明有光澤。果皮內面油潤味酸，少有帶核的，很似小干棗。新貨鮮紅色，放過夏後變為紫紅，蒸後變黑（入藥時）。

用 途：補心腎、治腎虛、腎虧。補中培脾。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防潮防蟲。

其 他：①萸肉核。也可入藥。

②杭萸片大、肉厚。紫紅色，質佳。

山 豆 根

別 名：豆根。小葛花根（南召果玫）

產 地：主產於嵩縣、南召、欒川等地，都是野生。

產 季：9、10月間產新，春天亦產，（但質較差，沒有肉氣，身空。）

產地加工：採挖後除掉殘莖須根和泥土，曬干即成。

商品規格：以個肥大，肉氣大的為好，即細小瘦，沒肉氣的為次。

鑑別方法：本品為園柱形（二頭細中間肥）細長的根莖，長約1~2尺，體發軟外皮呈暗褐色，有橫紋，上有蘆頭（蘆頭下細）折斷面為黃白色（皮淡黃分層）。有菊花紋，味苦。

用 途：清熱解毒，適用於咽喉腫痛，喉癢、喉癰、咳嗽、氣喘、腹脹等症，有輕瀉之效，也可外用。

包 裝：席包大捆。

貯藏：防雨、干燥保存。
其他：伪貨：外皮光滑而薄，上粗下細，也有蘆头，但下面不細。

山 大 黄

別名：山赤子。

產地：洛陽专区、嵩县等地。

產季：七月下种，次年出苗，长2~4年可刨挖，一般在霜降后出新。

產地加工：①出土后用碎碗片或竹板刮去外皮，鮮貨見鉄发黑（可用鉄刀切开），然后晒到五成干，收回切成1.5—2寸的个头，謹防冻坏（若天冷以火炕干），最后用荆箕与爐渣撞去外皮而里呈黄色。

②挖出土后放通风处干燥放入箕內撞好。

商品規格：本品不分等級，仅看其色黄，質坚实者好，心帶紅色虫不蛀者抽溝少，体重則好。色暗灰者，心发微黑，虫蛀者为次品。

鑑別方法：本品为圆柱状，或不規則的块状物，长约5—6寸經加工切成寸半—3寸长，身有抽溝色黄，断茬有紅色花紋，气味小，河南产品，水浸液为黄色，而山西大黄有紅头水，浸之过夜則有絲（粘性大）。

用途：泄下剂、清热、通便。

包裝：內用麻袋，外用竹箕（100—150斤）。

貯藏：①怕潮、怕虫、受潮变黑色（可用硫黄防虫）。
②放之時間过久色变黑，（質量变化不大）。

其他：几种貨之特点；

西寧貨：質堅實帶有羊毛的穿孔，味清香，橫槲荊，皮黑鴨蛋個為好，野生（雜毛袋裝）。

甘肅貨：堅地、皮黃外形有吸心，成屁股門（凹入深陷）麻袋裝。

河南貨：荊黃色，個頭大，黑溝，肥而長，多是曬干，用席包之，本品性暴有強惡氣味，皮粗發黑。過去河南都不用此品，多銷商丘以東地區。

山 天 麻

別 名：天麻。

產 地：主產於南陽專區的內鄉馬山口（產品最好），和洛陽專區的嵩縣、盧氏。野生。

產 季：冬春二季。

產地加工：將挖出之天麻用淨水洗掉泥土，然後放入米湯鍋中煮到內部煮透無硬心為止，此時皮亦脫落，變成透明，撈起曬干即成。

商品規格：以個大肥厚質堅實，色白透亮的為好，

鑑別方法：本品為山天麻的地下根莖，體呈長橢圓形，外表皺縮不整齊，淡黃白色，稍透明。

山天麻：個較大，長約3寸，寬約2寸，多為空心，體較輕，皮粗，斷荊發亮，呈灰白顏色。

川天麻：多呈長圓形，實心。

明天麻：（產雲南）個大、皮細色白、實心、斷荊發亮。

用 途：祛風解痙，適用於眩暈語言不遂、卒倒，諸風麻木不仁及小兒風癇驚痛。

包 裝：布袋或麻袋。

貯 藏：防潮，夏天要常晒。

山 沙 参

別 名：南沙参。

產 地：洛阳、信阳、南阳专区各县均产。

產 季：秋后，春冬两季也产。

產地加工：本品入藥为地下根部，在八九月挖出，洗去泥土，趁新鮮时用毛竹片或毛竹篾刮去皮（刮后不能遇雨或用水洗，否則即会变黄），晒干即成。

商品規格：不分等級，以色白有粉气个大完整，条粗，不生虫为好。

鑑別方法：南沙参圓柱形，类似桔梗，質松体輕，其表面有黄白色并带有棕黑色橫裂的皮孔，甚易折断，断面粗糙虛泡，全身皮皺，根之上端有根茎俗称卢头，但无卢碗味带甜。

与桔梗的区别：

①圓紋、身空、而質松。

②无菊花心。

③有微甜味（桔梗苦）。

④其切片易碎。

⑤沒卢碗，卢头大些。

用 途：祛痰清肺治咳喘。

包 装：席包。

貯 藏：要防潮。（防虫〔夏日易生虫〕，夏天应注意炕之。）

山 川 柳

別 名：檉柳。

產 地：开封、商丘二专区产，野生于砂地盐碱地。

產 季：春季主产，其他季节亦产。

產地加工：把枝条剪下后晒干即成。

商品規格：不分等級，粗細不分，枝叶亦都一样入藥。

鑑別方法：本品为山川柳树枝上稍細嫩的枝叶，綠色呈鱗状粗枝梗呈紅褐色，断面为白色。

用 途：发表、出疹。利尿，解毒藥治关节風濕。外用治癬。

包 裝：用席包。

貯 藏：置于干燥通风处，防潮湿或发热变质。

山 胆 草

產 地：主产南阳、商丘、許昌专区，野生。

產 季：秋后9—10月間收采，春季产的質次。

產地加工：挖出土、去淨泥土，晒半干打小捆，再晒干即可。

商品規格：以淨无土，色土黄，沒头叶，肥大条长，卢头小者为佳。

鑑別法方：本品以地下部分入藥，外觀为多条須根，簇生于一蘆头上，黑土紅色（近土黄色），須根多抽皺不平上粗下細，略弯曲。断茬呈黄白色或橙黄色，味极苦，有臭气。

与其他商品之区别。

川胆草：身肥大，色黄。

鎮江产胆草：商品多帶有叶子。

用 途：消化道炎症如腸胃炎、肝經实热之症，治眼赤肿痛，小儿惊痛壮热。

包 裝：席包（打濕而后装包）

貯 藏：防潮。

山 构 杞

別 名：杞子、构杞子、紅耳墮棵。紅青椒、構蹄子。

產 地：以洛阳专区的潼关为主产，其他到处都产，野生家种。

產 季：秋后8—9月。

產地加工：摘干后去柄晒干即成。

商品規格：現在当地收購不分等級，出口貨有分等級，以个大小，色紅肉气好分为貢果，（24个—1錢，也有20—22顆一錢时）大撰、魁元、枣核、改改、杞王等。

河南产品子小干味苦沒有肉气，子多色黄紅。（洛阳专区潼关杞子肉气稍好。色稍紅些。）

西杞子为宁夏中宁县主产、个大色紅肉气大、子很少、酸甜、子軟。

鑑別方法：本品为鮮紅色柔軟的果实，外皮縮皺，形似枣核。其干燥粒为紅色，質硬、味微酸。

用 途：滋阴补肾，目眩昏暗多泪、消渴、腰脚痠軟等症。

包 裝：装小箱（20斤）箱內襯油紙、布袋、棉紙、过夏时应每包一斤，上部少放一层石灰粉，順序排列箱中，石灰吸水則不生虫。不能用硫磺炕，因薰后有气味，色也不好，热出了油色变黑为次貨。

貯 藏：防潮、干燥保存。

干 漆

產 地：主产洛阳专区的卢氏、欒川。

產 季：秋天。

產地加工：割出之生漆流于桶中，其上部凝固后之块状物取出干燥即为成品。

商品规格：不分等级，无杂质为好。

鉴别方法：本品黑色不规则，成颗粒性块状物。质轻松、断面有发亮的小点，有漆的气味。

用途：破血。

包装：席或麻袋。

贮藏：置干燥处。

其他：①产漆时过滤下来的渣，晒干后即成为成品。

(也有此用法做干漆)

②外地产，为凝集的块状物(不纯)。

五味子

别名：山五味、西五味。

产地：洛阳、南阳专区、其他专区也产。

产季：八、九月产新。

产地加工：采下后，把果柄去掉，置锅中蒸一下，晒干即为成品。

商品规格：不分等级，果皮黑色，肉厚而显抽皱的，纯干者为佳。

鉴别方法：市场上的商品有两种，一种为山五味，一种为辽宁产的辽五味。山五味呈圆球形。皮黑色、收缩不规则、坚硬没有光泽、内有一个淡黄色肾形的种子(少数含有两个种子)，味酸而咸但较辽五味为淡。

辽五味色紫红、质柔润、发粘，果皮肉厚有光泽、剥除籽后，很似山萸肉。其中多为二个肾形的种子，个亦较大。皮酸、肉咸、籽苦辣。

用 途：止咳、斂肺，治虛勞羸瘦。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防生虫、防潮产品含有油質及水分，往往在冬季不易干透到春夏时易发热变质或变色。应置于干燥通风处，以免霉烂变质。

其 他：无辽五味时，多用此貨加醋后蒸几次代辽五味应用。但疗效差。

五 倍 子

別 名：蚊閣

產 地：主产南阳专区的内乡；西陝、洛阳专区的嵩县；信阳专区也产。

產 季：九、十月間产。

產地加工：五倍子是五倍子蚜虫生长在小灌木（盐肤木或其他灌木）的树枝上，秋后长成时把它采下晒干即成。

商品規格：分为：独角倍：以个大皮厚、質堅色青褐为好。

花倍：皮薄質脆灰褐色，不規則多角形，質量較次。

鑑別方法：本品为干的虫癭，形状不定，有呈菱形，卵圓形或不規則形亦有角状。灰黃至黃棕色，外表披有灰白色滑軟的絨毛，皮壁薄質堅硬而脆內部为空洞。藏有多数灰色粉状如蚜虫尸体，并有腊样之物味涩。

用 途：利濕、治喉症（粘合其他藥粉，附于喉部，不易脫落）。收斂用于火伤和燙伤，又为止血剂，并用作解生物鹼的中毒。

包 裝：麻袋。

貯藏：置干燥处保存。

五 加 皮

別名：桂柳叶根（洛阳专区）

產地：洛阳、南阳、信阳三专区。

產季：春秋兩季均产。

產地加工：春秋挖其根，去骨留皮晒干即成成品。

商品規格：粗大肥厚、片大不碎、色白者为好。

鑑別方法：本品常呈細长卷筒状的根皮，长短不一、厚約7分許，外表土灰棕色、較光滑、稍有細皺紋，內表面灰白色，質脆，折断面平坦，有香味。味微苦。

信阳专区产的皮灰色，肉質厚味香，为南五加皮。洛阳产的皮呈浅黄且薄叫山加皮、質地較差。（与地骨皮的区别：地骨皮，皮色发黄且厚，沒香味。）

用途：去風濕、壯筋骨。

包裝：席包。

貯藏：置干燥处保存。

五 灵 脂

別名：糖灵脂（指灵脂块）、血灵脂、灵脂米。

產地：主产于南阳专区的泌阳、新乡专区的济源。洛阳专区。新乡专区的（輝县）也产。

產季：四季均产。冬季易找到。

產地加工：采集方法是冬季、藥农到深山石洞中去寻找，采得后带回即后。

商品規格：分为灵脂米与灵脂块两种。

灵脂米：又分两种规格光头：表面光滑纯净、无杂。

毛头：表面不光滑、有杂质、有碎块。

灵脂块：不分块的大小，以无石块、色黑亮的为好。

鉴别方法：五灵脂是飞禽寒号虫（寒候鳥）的尿。灵脂块，体重质坚似石块。色黑亮，断茬油黑发亮，有圆形黄点（是灵脂米断茬）。

灵脂米，是长圆形或圆形的小粒，形似鼠屎，但两头圆，黑褐色，质较轻。

过去有用灵脂米加糖稀（饴糖）或米汤等物而制成块充作灵脂块出售，此药品体轻货泡，易碎，切开后有完整的单粒（灵脂米）存在。

又陕西省九泉县产的五灵脂质次，不如本省产品。陕西产的灵脂块色不黑、不发亮；灵脂米，个大发泡，碎面多。过去也有用蟪子尿充灵脂米的，此药品个大色黄、圆形。似羊屎。

用途：通利血脉，行瘀止痛，可治产后兒枕痛、經痛、心腹痛、疝瘻崩漏、腸风、小兒疳疾、敷蚊、蝎、蜈蚣咬伤。

包装：麻袋（100斤上下）。

貯藏：防水（見水成块）。

其他：五灵脂是飞禽寒号虫（寒候鳥）的尿。此鳥千里寻食，一处宿窩、夏季毛多，冬季无毛，冬季不能飞出打食，因此，冬季时此鳥反复吃夏季拉的尿粒。根講，經多次反复者即成“灵脂块”，反复次数少或夏季拉出者即为“灵脂米”。

升 麻

別 名：山升麻，綠升麻。

產 地：主产于洛陽南陽專區各縣。

產 季：秋后（與蒼朮同時採挖。）

產地加工：挖下后，去苗秧，晒2—3日后，使須根干透，主根未干时，平鋪地上，上鋪一层柴火，用火燎去須根，再晒干即成。也可以將須根剪去后晒干。

商品規格：不分等級。以个大，身干，無須毛为佳。

鑑定方法：河南產升麻，一般稱山升麻，是全黑色之根（根莖），通體帶多數疙瘩，有多數凹窩（較小于河北省產者）須毛多，身干瘦小，體堅質硬，不易折斷。

用 途：發表治疹，提氣治疝氣，除風。

包 裝：麻袋席包。

貯 藏：防雨防潮，放通風處。

其 他：①據說：紅升麻（根紅色）一有毒，綠升麻（根綠色莖白色）一入藥。

②河北省產品稱為升麻，外皮色灰褐，無疙瘩，凹窩大，須毛很少（多被燎淨），體輕質松軟，較易折斷。

天 南 星

別 名：南星，禹南星，會南星（禹縣是藥材集散地而得名，會指的是禹縣的廟會）。

產 地：許昌專區的禹縣、長葛兩縣主產，多為家種，洛陽專區也產多是野生。

產 季：二月下種，秋季八月產新（霜降前）。

產地加工：挖出后将秧苗（地上部分）全部去掉，用竹刀刮去外皮，再用水漂去刮下的残皮（去皮时应带手套，防止中毒）然后放在架起的高梁薄上曝晒，不要受潮湿，不要翻动，否则颜色发红或变黑并崩裂。如遇阴天不宜加工因去皮后不及时晒干即发霉，一般加工方法是晒至快干时用硫磺熏一次，则色白易干。未加工的带皮货可放数月不坏。个太小的南星可放在竹筐内撞去外皮。

商品规格：南星的质量好坏，不决定于大小，而决定于颜色，粉质如何，以色白、肥大无胶底的为佳。一般不分等级为统货，出口外销分两级。

一级品：色白、肥胖，底面凸起（俗称蛤蟆肚）。

二级品：色黄白，瘦小，底面不凸起或凹下。

鉴别方法：南星分为野生与家种两种：

家种南星质量好颜色白，形状很似虎掌是缺圆形状，上面有窝（叶或芽残痕）其周围有多数虫眼（根痕），下面凸起似蛤蟆肚。

野生南星颜色发红，分叉少，表面粗糙，虫眼粗，有疙瘩。

野生南星多不去皮，都在中间（横断面）切开。

野生南星浸于白矾后变粉红色。

家种南星浸于白矾后变白色。

用途：清肺化痰，驱风（熟货），外用杀菌（生货）。

包装：席包（每件150斤），出口的里面用麻袋装，外面包席。

贮藏：防止受潮，以免吸水发霉。发霉后可干刷去霉，不能着水，防止破裂。晒纯于装包较好。

天 門 冬

别名：天冬，地冬，鈴根（洛阳专区）。

產地：信阳、洛阳、許昌、新乡、南阳等专区。

產季：二、三月或七、八月間（以七、八月产的为佳）。

產地加工：挖出土后，用水洗净蒸熟，用手剥去外皮，晒干即可。

商品規格：本品分为一、二等。一等品：通体饱满，半透明，色黄白，或带褐色，沒有存皮（即原植物之皮）。

二等品：体瘦小，扁平，外包有存皮，不透明。

鑑別方法：本品是天門冬的块根，状似小紅薯，加工之后为紡錘状的半透明体，外觀饱满，有时也带有深凹的溝，外皮呈淡黄白色或带褐色，味甜，吸水后粘性大。

用途：养阴清肺，止咳，消痰，清金降火，凉血鎮心，利小便潤大便。

包裝：席包，麻袋。

貯藏：①防潮（易吸潮、易长毛）。

②若生霉于水中洗的时间不能过长，因粘性很大，可以用濕毛巾擦淨。

天 麻

別名：定风草、赤箭、回龙子、仙人脚。

產地：洛阳专区的洛宁、欒川、信阳专区的商城，新县等县。

產季：每年可产两季，春麻3—5月采，冬麻9—10月采。

產地加工：在采期时间，挖出其根，摘去根須，刮去果皮，洗净蒸熟，晒干。（洛阳专区是用米湯煮熟后晒干）。

商品規格：以个大色白肥胖，坚实有光泽者較佳。冬麻較

好，質堅不虛。市場分為一等品（肥大，堅實），二等品（質堅不虛），三等品（個小、質飽）。

鑑別方法：本品是橢圓形，地下根莖，已刮去外皮表面黃白色有縱皺紋，質堅硬，斷茬為黃色或淺棕色，有光澤。有腥味。

用途：主要能祛風，解悸瘧，適用於眩暈頭痛，半身不遂，語言不遂卒倒，諸風麻木不仁及小兒風癇驚癇等症。

包裝：布袋或麻袋。

貯藏：干燥保存。

其他：天麻莖高2—3尺，紅色，圓形直立中空有節，很似箭杆，故又名“赤箭”，據說此物遇風不動，無風反搖，故又稱“定風草”。

天 仙 子

別名：萸蓉子。

產地：主產於禹縣、長葛兩縣，均系家種。

產季：春季種植，七、八月產。

產地加工：連秧割下，晒干，采下籽，除去土雜和葉子即成。

商品規格：個均勻，飽滿為佳。

鑑別方法：本品為灰色很小的扁形種子，二面凹下，表面有波狀網紋。

用途：鎮痛，鎮瘧，內服治喘息，胃痛神經痛，用於劇烈的咳嗽，百日咳等。

包裝：布袋。

貯藏：防潮，吸濕後發黑。

天 仙 藤

別 名：馬斗鈴藤。

產 地：信阳专区各县，洛阳专区欒川、嵩县、卢氏等县均产。

產 季：秋季，九月間采集。

產地加工：霜降后連秧割下晒干即成。

商品規格：不分等級，以杆叶青綠色不霉烂不变白的为好。

鑑別方法：本品为带叶的藤，长数尺，綠杆上有順紋空心，杆細約1分左右，上部綠色下部褐色叶呈三角形，有特殊的气味。

用 途：主治痰結喘促。

包 裝：席包或打成捆。

貯 藏：防潮，見水后叶发軟变白。

其 他：果实（馬斗鈴）根（青木香）都入藥。

水 蛭

別 名：馬螯，水螞蝗。

產 地：南阳专区为主产，多生于水中或田間。

產 季：夏秋間。

產地加工：在夏天將絲瓜絡中間灌点猪血、放在水里，等水蛭入絲瓜絡內，取出煮死、晒干即成。

商品規格：身干，无虫，以体小，黑褐色为好。

鑑別方法：体长2—3寸、色黄帶綠形扁而闊、头尾尖、晒干后，黑褐色或棕色、質硬体多节（东北来的体长而扁，色

黃。本地产的色黑)。

用途：通經、消痰、治小腹胀痛、干血癆等症，可延緩血液凝固。

包裝：麻袋。

貯藏：防虫、防潮、干燥保存。

月 季 花

別名：月季。

產地：河南各地都产。

產地加工：当花将开时，采下含苞待放的花朵，放日光下一次晒干即成，遇阴雨天不能采，晒不干易发黑，質量变次。

商品規格：以色紫紅，未开的花苞，朵硬不散，气味大的为好，依其色气的好坏，分为两个等級。

一等貨：色紫紅，不开的花苞，朵紧而发硬。

二等貨：色黑紫或紫褐色，花朵已开或散朵，味小。

鑑別方法：本品紫紅色将开的花，花瓣多数，下部花托(萼)呈五角形，近花柄处呈圓球状深褐色，有特异香气，略似桂花香味。

用途：妇科藥。

包裝：紙包一斤一包，而后装木箱。

貯藏：防潮，防晒(晒干走色)防虫。

木 通

別名：山木通。

產地：南阳专区。

產季：秋冬两季产新。

產地加工：落叶后割下，放在晒至六七成干时，把弯曲的压直，捆成大捆。

商品規格：色发黄，体直，不要过粗过細（最好是像指头粗細），以关东木通为最好，关东木通又以金錢木通为好（粗細如銅錢，切片后似銅錢）。

鑑別方法：本品为木通的地上蔓茎，呈圓条，粗細不一，全茎中部皆能过气，外皮土黄色，內皮細，为黄色，折断面黄色，有无数綫紋，味苦。西木通：体比較細，节亦长。

用 途：利尿，清热适用于小便短赤，淋閉，导尿路炎症。

包 装：打成大捆。

貯 藏：防潮，見水后变黑发霉。

木 槿 花

產 地：各地都产。

產 季：六、七月間。

產地加工：采下后将花晒干即成。

商品規格：不分等級，以干淨不发霉色白的为佳。

鑑別方法：本品干燥的花朵有五个短柄的花瓣。較石榴花大，有白色和紅紫色二种。

用 途：和血，止带。

包 装：布袋。

貯 藏：防潮，吸湿后发霉变黑。

木 瓜

別 名：山木瓜。

產 地：信阳专区。

產 季：夏季（伏天）。

產地加工：伏天在木瓜大如桃子尚未成熟时，摘下来，切

成兩瓣，蒸大半熟後，放席上曬干即成，但注意切時必須直着切成兩瓣，不能橫切或偏切成片，影響規格，曬時先曬里边，再翻過來曬皮以防曬花，如遇陰天，可將木瓜堆放地上等天晴時再切開蒸曬，因切開後無處曬，容易發霉。

商品規格：不分等級，以身干，色紫紅、塊不大，個均勻不霉者為佳。

鑑別方法：本省產的山木瓜，豎切為兩瓣的果實（少有切為三四瓣的）。外皮紫紅色，切開的表面棕紅色，帶黑紫色扁三角形的種子，質堅硬似木質，肉厚。

四川產的木瓜稱“川木瓜”個小，色淺紅，肉薄，皮外有皺紋，切橫片後有花紋，質佳。

用 途：①治霍亂轉筋，腳氣沖心，可用于腓腸肌痙攣痛，痛風腳氣等症。

②去濕熱，利筋骨，腰足無力，因濕而筋骨作痛。

包 裝：麻袋席包。

貯 藏：置干燥處，受潮發霉。

牛 黃

產 地：河南產者為“漢黃”，以靠近山區的洛陽、信陽及南陽專區的西部、北部為主產地。如漯河、駐馬店、確山等地產量多，集散地為洛陽，鄭州和禹縣。

產 季：四季均產。

產品加工：牛黃是牛膽中的結石，一般講牛黃多生長于牛之膽中，因此只有在屠殺牛時方能采得。其加工方法是：將牛殺死後，取出牛膽，如發現有黃，應馬上取出，以燈草包好，外襯棉花和紙，放杯里用體溫暖干，此法產品最佳，色黃不

裂。如不当时取出，牛黄浸胆汁浸久则色黑发暗，如取出后见风或日晒均使产生裂口，色气也不好。

商品规格：不分等级（除管黄外）。

鉴别方法：真正的牛黄不管个大小，形如何，均是由多层紧紧包裹而成俗称有年轮，质轻干、易碎，以唾液沾牛黄粉涂于指甲上显鲜黄色擦不掉，并且能由指甲的里面看出黄色，俗称“透甲”为其特征。

入口有清香、过喉，味浓者是汉黄，清香味小，不过喉的是印度黄。

干、湿的鉴别：干透之货不粘手，体轻，以脸贴于牛黄上有湿热的感觉。如是湿货贴于脸上则有凉的感觉，另法是以针刺之，刺入牛黄时内外一样顶针时，即为干货。如内部虚软不顶针者即是内部未干的湿货。

用途：清心介热，利痰凉惊，适用于热病发狂言谵语或热盛，神志昏蒙，镇痉定痛也适用于热病狂惊及小儿风热抽搐夜啼或口噤不乳等，禁忌：孕妇禁用。

包装：纸包，盛于盒内。

贮藏：防潮（吃潮后，裂口脱皮成碎片），防压。

其他：过去牛黄由其产地及质量不同分为以下几种规格：汉黄：有长圆形、卵形、方形、肾形各种，外皮为杏黄色，带有“乌金皮”（外部有紫黑色发亮的色彩，似矿石表面）。从破碎部分看，是由很多层包裹而成，以少量入口后清凉过喉，并有微苦、酸、辣、甜之味。刚吃时微感苦而凉。

不熟的“汉黄”色呈淡黄白色，入口后发腥。质次。

印度黄：据说是由广东进口的印度产品，所以又称“广黄”实非这样，多是汉黄去广东后用某种方法提去精华（精液）之后而得之牛黄，此种牛黄色发红。也分层清香味小，不

过喉外形很似汉黄（藥工認為）。

片黄：是細小的碎片或小块。色气、分层等均似广东来的广黄，据講也是經提出去精液而后所得。

管黄：是薄如紙片的碎片，多是半管状（故名）很碎，顏色发黑，質量最次，过去差价很大，只有汉黄 2/5 的价錢。据說是由牛的“气腔管”（可能是輸胆管）中取出的。

牛 膝

別 名：怀牛膝、怀牛夕。

產 地：主产于新乡专区的武陟县（原怀庆府，故名怀牛夕），博爱、溫县两地也有生产，其他县也有种植。

產 季：初伏前七天种籽，冬至后出新。

產地加工：牛夕加工分为以下二个阶段：

1. 毛牛夕加工：收获时期，先割去地上秧苗，在牛夕地的一側，挖四尺上下的深溝，然后依次挖取牛夕根。出土后先捆成小把，少沾水后放荆簍中用硫黄燻一次（方法同燻山藥一样），每百斤用硫黄半斤到十两。然后架繩上晒干，干后按粗細不同概略的分为特肥、头肥等規格，捆成大把（每把約十斤左右）即为毛牛夕。此貨还帶寸长左右的籠头（苗子）。

2. 成品加工：藥材收購部門买到毛牛夕后，打开把，切去籠头，再按原把捆好，稍沾水后放硫黄炕中燻一次（不沾水燻不好）每百斤用硫黄一斤四两，燻后色气鮮艳美观。然后打开把，按粗細不同精确的分为特肥、头肥、二肥、平条。牛夕肉各种規格，同时打去小叉（枝）及毛尖。这时再用硫黄熏一次，每百斤用硫黄 2 斤，最后按各种規格分別用紅头繩捆成小把，削齐把头即为成把。将成把放薄上晒干，干后梁屋內放 5~6 日，使身条棉軟，再用拔板（木制的刻度板），拔为不同长度的把即为成品。

商品規格：牛夕以皮細、肉肥、質堅、色鮮、身長、黃白色與肉紅色為佳。（西陶村產品肉紅色，架保村產品土黃色，二者質量一樣），外皮現黑灰色。斷茬黑色有油的為次貨（俗稱油條）依粗細不同分為以下幾種規格，同一規格的條長則價高。

特肥：每把為6~7條，把頭直徑約7~8分。

頭肥：每把為8~9條，把頭直徑約7~8分。

二肥：每把為13~15條，把頭直徑約7~8分。

平條：每把為20~25條，把頭直徑約7~8分。

牛夕肉：捆的把較大，無一定條數，多是細條而短，色氣不好的次貨，1958年9月為簡化商品規格，降低成本，已決定將牛夕規格改為以下三等：

一等：條粗1.8分以上；

二等：條粗1.8~1.3分；

三等：條粗1.3分以下。

鑑別方法：牛夕是細長的根，長約1~2尺，有達3尺長的；粗約1~2分。外皮肉紅色或土黃色，通體獨條無叉枝，有較細的縱直皺紋，少有削去須根的痕跡，手握之略柔軟，質脆易折斷。斷茬黃白色或肉紅色，中間有白心，味甜。

用 途：①生用治婦女經血不調，胎死腹中，產後心腹疼痛，破症瘀逐十二經惡血。

②酒浸蒸用則能補肝腎、腰膝作痛，四肢拘攣，男子陽痿，老人遺尿。

③解毒消腫止痛的功效，如五淋血尿、癰疽惡瘡，陰莖痛、下痢、喉痹等。

包 裝：好貨裝箱按出口規格標準，每箱淨重100斤。箱內襯麻紙和牛皮紙，箱外先糊麻紙，再塗血料和桐油。次貨（牛夕肉）用席包，重量不等。

貯藏：严防受潮，受潮后出油发黑变油条或发霉。装箱后亦应放干燥处，防止箱子破裂，裂后易生虫。

牛 蒡 子

別名：大力子、牛子。

產地：产于禹县、长葛、嵩县、安阳等地也产，家种。

產季：第一年秋季，八月下种，春初取苗移植，秋后收籽。

產地加工：果实完全成熟后，用剪子剪取果枝晒干，打落种子，然后簸净即可（量大时，可用碾子碾。）

商品規格：不分等級，以身干、飽滿、干淨为好。

鑑別方法：本品为牛蒡子的果实供藥用，略呈长卵形，一头尖、一头大、大小似甜瓜子，扁平而稍弯曲，外表灰黑或黄褐色，带有多数灰黑色小点，并有縱紋数条（似麻雀的羽毛，）質坚皮硬，切断面白色，油性大，味苦。

用途：利尿解热，治风濕癩疹，咽喉风热，其根为利尿剂，驅风剂泻剂。

包裝：麻袋。

貯藏：防潮。

王不留行

別名：王不留、禁宮花、麦連子、媽不流、胖婆娘腿。

產地：河南各地都产、多生于麦地中。野生。

產季：五月。

產地加工：麦熟前当王不留快熟时拔下全秧（熟后果实破裂、損失种子）晒干后搓下种子即成。

商品規格：不分等級，以飽滿、無土、純淨者為佳。

鑑別方法：本品是正圓形種子，色黑或棕黃，大小很似白芥子。斷面白色粉性大含多量淀粉，炒後完全裂成開花狀為其特徵。

用 途：催奶、下乳（多與穿山甲共用），現在有用為釀造原料。

包 裝：布袋或雙麻袋。

貯 藏：防潮（發霉）

毛 桃

別 名：桃奴。

產 地：河南各地都產，家種。

產 季：五、六月產新，多是秋桃的枯干果實。

產地加工：自落後收集曬干即成。

商品規格：枯干自落的果實為好，個大有核的為次貨。

鑑別方法：本品尖卵圓形的果實，左右不對稱，長約3—4公分寬2—3公分，表面呈灰黃色粗糙皺縮，有網狀稜紋，質硬有毛，一端有柄，基部圓形凹下，味微酸。

用 途：婦科破血。治盜汗，吐血、瘧疾。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防潮。

丹 參

別 名：血參、紫丹參。

產 地：主產於洛陽專區的嵩縣，新鄉專區的輝縣，其他各區也都有產。

產 季：春秋出新，秋后出土者為佳，質地堅實，春季出土者內多發泡。

產地加工：出土后，去苗及須根，整理干淨，晒干即成。

商品規格：不分等級，通常以個體肥大，外表紫紅為佳，外皮糟易脫落者為次。

鑑別方法：本品藥用其地下根，類圓形，長條狀，通常不帶苗，無須根，外皮紫紅或棕紅斷茬中部為黃白色，有骨氣（肉質肥厚），質柔軟結實，味苦澀。

用 途：補血、活血，婦科要藥。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮防蟲。

火 麻 仁

別 名：小麻仁、小胡麻子。

產 地：主產新鄉專區，其他地區亦產。

產 季：秋后八、九月產。

產地加工：采集后晒干打下果實，去淨雜質晒干。

商品規格：不分等級，以淨貨無土為好。

鑑別方法：本品為橢圓形灰黃色的瘦果，大小似高粱，外表光滑有細網紋，一側有半圓形帶黃白色的稜，皮薄質脆，內仁白色油性大。

用 途：①潤燥通便適用於虛人大便燥結。②活血潤燥通乳汁，③塗諸瘡癩殺蟲。

包 裝：麻袋。

貯 藏：干燥處，防鼠咬。

六神糰

別名：神曲、六曲，陈糰。

產地：河南各地均产，以禹县产的較多。

產季：四季皆产。

產地加工：

(一) 制糰：六神糰成份。

青蒿、蒼耳子、野蓼、杏仁，赤小豆，各 5 斤，
面粉 75 斤（內摻麸皮 15 斤）

原料处理：

杏仁，去皮后，用水泡 2—3 天（夏天二日，冬天三日）煮約一小时，去苦（毒）味。

赤小豆：煮到豆开花，研成泥状，晒干。

蒼耳子：碾去外部的刺，炒焦。

青蒿、野蓼、撰去杂质，鋤碎。

以上各料混合研細备用。

发面（即发酵）：

将面粉（75 斤）分三盆（量少便于拌均）共加水 25 斤，再加大糰半斤，用手拌均匀，进行发酵（室內应保持 25°—30°C 左右）約需 48 小时（夏）——72 小时（冬天）发至不能再发（即发到不能再凸起为至），发酵好，于制块之前一天，再加糰使之再发酵一次，即可制块。

(二) 制块到包装：

取发酵好的原料，用手团成园团块，再放入模型中，打上印（商标）——每块 1.7—1.8 两，取出，凉乾（阴乾 2—3 天）每天翻 2—3 次。三天之后可于太阳下晒乾，晒至六成乾装火炕，

炕干而后再炒微黄（砂子炒）。

注：①发酵时温度 25° — 30° C较好。

②发酵时应拌搅均匀，加水量应适当。

商品规格：本年度的糶不用，愈陈愈好，虫不蛀，酸味大香气浓色微焦黄为佳。

鉴别方法：本品形似砖块。陈久呈淡褐色，断茬灰白色有虫孔，有发酵气味发黑发霉不好。

用 途：消食、下气、健脾、养胃。

包 装：纸包、装箱。

貯 藏：干燥、防虫。

五 划

白 前

别 名：鹅管白前，白马鬃。

产 地：主产于信阳专区，新乡专区原阳、商丘专区、
太康，郑州地区也产，野生。

产 季：春秋季产。

产地加工：挖出后，去苗晒干即可。

商品规格：不分等级，以无土，无泥为佳。

鉴别方法：本品为白前的地下根部，长1—2尺，粗分许，
头部灰色，下部分枝很多，长条的根空心，不易折断，断面灰
白色，味苦微辛。

用 途：镇咳，祛痰。

包 装：席包。

其 他：秋后回苗时采收者为佳。

春产者質量差，皮肉薄韌性大，外皮易脫落。

貯 藏：置于干燥通风处。

白 夫 子

產 地：許昌专区长葛县，禹县为主产，新乡专区，許昌专区也产，均系家种。

產 季：八月中旬种植，明年七月底八月初出新。

產地加工：出新后用水浸泡再用竹刀割去皮，（有毒操作时应戴上手套或包以布，）然后放在高粱薄上晒干（防止曝晒否則容易破裂）即可。

商品規格：不分等級，以色白，肥胖个大为好。

鑑別方法：本品为白夫子的地下部分入藥，外观长卵形下部略尖长约一寸左右似蚕茧，上部有窩（茎痕）通体有虫眼（根痕）質地坚硬，外部呈灰黄色，断面白色粉性，性极毒（生品不可入藥）能使舌尖发麻变硬。

用 途：驅风，祛痰。

包 装：席包（150斤），

貯 藏：防潮湿，防虫蛀。

其 他：此品价格低廉，过去有人充半夏（取小的或挖窩掺假）。

白 芷

別 名：禹白芷、会白芷、香白芷。

產 地：許昌专区禹县、长葛为主，均是家种。

產季：秋分前后下种，第二年（生长十个月）初伏即可出新。

產地加工：长成之后，先去地上秧苗，将白芷挖出后，把白芷根部放于地上晒干即可，若遇雨季可于炕上烘干。也有挖出之后不去苗，到晴天再去苗，晒干也可。干后有小叉加工时修去。

商品規格：收購时不分等級，多是統貨，但按質量分为三級：

独枝、皮細，外皮为土黄色，坚硬光滑細膩茬白有菊花心为一級品。

独枝、有深紋，茬白者为二級品；

独枝，或有小叉枝，糠心皮有皺紋色深者为三級。

鑑別方法：本品为白芷的根部，呈順圓錐状，很似小胡蘿卜，长约4~5寸，粗約3~6分左右，（也有小的）。其外皮呈黄白色，断茬中有黄圈，有特殊芳香味，故名香白芷

用途：祛风止痛，适用于治伤风头痛，偏头痛，阳明头痛，鼻渊及妇人腰痛，赤白漏下等。

包裝：木箱（出口）和席包（內銷）。

貯藏：放于热麦糠中干燥保存，（因易生虫，生虫后很快即成空洞）。

其他：①野白芷，紋深而大，皮色暴，身虛，粉气少，質不坚硬，×多，气味弱。

②种子不能隔年，否則不出苗。

白芥子

產地：主产于商丘专区，夏邑、睢县、許昌专区长葛、禹县也产。

產 季：春天種植，五六月收。

產地加工：用鐮刀連莖割下，晒干，然後打下，除淨雜質即為成品。

商品規格：不分等級，以色白，子粒充實，無土無雜為好。籽粒瘦小，不充實，有雜質，次之。

鑑別方法：

白芥與大芥的區別：白芥子：小圓球形，黃白色種子，種皮脆薄，表面有小窩點及細微的網紋，乾燥品無臭，研碎後加水浸濕，發特殊辛烈的芥子氣味。

大芥子：種子小，顏色有些發紅。

用 途：化痰。

包 裝：用雙麻袋或用布袋。

貯 藏：防止吸潮，發霉，吸水後發粘結塊。

白 果

別 名：銀杏

產 地：主產於信陽、南陽、許昌等專區。

產 季：九、十月採果。

產地加工：採下後，用木板搓去外皮（果皮及果肉），洗淨晒干即為鮮貨。

商品規格：不分等級，以個大、飽滿、色白。不發霉者為佳。個小發黃者為次。

鑑別方法：白果外皮堅硬、光滑、灰白色，內部種仁黃白色，其外皮白色，中間有黃綠色心（此心微苦有毒）。

用 途：補肺、利濕、治白帶。治陰毛蝨（八角蝨，以果仁擦之即成。）

包 裝：麻袋（一百斤上下）。

貯藏：防霉，破皮后过夏即易腐烂发霉或生虫。

白 蒺 藜

別名：刺蒺藜

產地：河南各地都产，主产于郑州、禹县、中牟、偃师、孟津等地。都是野生。

產季：立秋以后产新（立秋前产品无仁，无肉，色青）。

產地加工：連秧割下，放地上晒干，打落蒺藜（果实）。放碾上碾，去刺，用风車扇去土即成。

商品規格：不分等級，以白色、飽滿者为佳。

鑑別方法：蒺藜呈四菱或六菱形，四周有刺多被碾破。无臭味。

用途：除风、明目、治眼疾。

包裝：席包。

貯藏：防潮。

其他：雨淋后发黑不能入藥。

白 凡 豆

別名：凡豆

產地：主产于許昌专区的长葛，禹县，均是家种。

產季：六、七月产新。

產地加工：果实成熟后，采下晒干，剝出豆粒（种子）即成。

商品規格：不分等級，以个大、肥胖、白色的为好。

鑑別方法：本品是腎形的白色种子，长约2—3分，寬約

1.5分，外皮光亮洁白，内有两瓣白色的种仁有豆腥气味。另有作食用的体小不光亮。

用 途：治白带。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮貯存（見潮色黄发霉）

白 蘇 皮

別 名：酸酱秧根，大赶杖叶根（洛阳专区）

產 地：洛阳、南阳二专区。

產 季：四季都产，春天产的身空，冬季产的較好。

產地加工：把根挖出后去掉骨趁濕打下皮，去皮晒干即成。

商品規格：以身干，白色，不碎。皮較厚无木心杂质为佳。

鑑別方法：本品为白蘇的根皮入藥，形为卷筒状，外皮白色或微带黄色，折断面白色較光滑，有青味，味苦。与地骨皮、五加皮的區別：**五加皮：**皮粗。色发紅黄味香。**地骨皮：**皮紧皮色紅黄。荏发灰。

用 途：有清热杀虫之效，适用于①疥癬、惡疮、风瘡、皮肤作痒及疮毒等症，②濕热黄疸及妇人产后热病阴中肿痛等症。

包 装：席包。

貯 藏：防潮（干燥处保存）。

白 薇

產 地：主产于洛阳专区的嵩县、伊阳、新乡专区的輝

县，南阳专区及商丘专区也产。

產季：秋冬季产新，春产品質最次（瘦小）。

產地加工：挖起后去苗叶晒干即成。

商品規格：不分等級，以沒土（須根間常夾有很多泥土）肥胖，外黄內白实心者为佳，須根瘦小色暗发黑者为次。

鑑別方法：本品以白薇的根入藥，是多数細小須根生于疙瘩連接而成的蘆头上，須根长约5—6寸，粗細半分許，須根紅黄色，肥胖，肉質外皮光滑平直，質脆易断，断茬黄色，中間有白心。味甘，蘆头多被須根所包于中間，每一疙瘩上均有一圆形凹碗。

胆草外形与此相似，但須根瘦小稍扁，断茬不圆中間无白心，味极苦。胆草蘆头是单个，不是数个連在一起。

用 途：活血介热、利尿等。

包 装：席包。

貯 藏：防潮。

其 他：安阳县称此为白前，称白前为白薇。

白 芩

產 地：灵宝、蘆氏、欒川等山区均产，內乡也产。

產 季：冬天采集。

產地加工：挖出土后洗去泥土，用籠蒸熟，脚穿草鞋踏去外皮，晒干即成，（本品初出土时身为棕紅色內白）。

商品規格：分三等級，一等九十个一斤，二等一百二十个一斤，三等一百四十个一斤，其佳品，質坚实为好。

鑑別方法：本品为不規則形或类三角形的块状根茎，外觀呈乳白色，頂端有一小乳头，通体有环状（似波紋綫）花紋、

搓白質堅遇水有粘性。

用 途：有止血的功能，可用于肺出血，久咳咯血，大便下血及损伤性的其他内出血等，外用，痔疮肿毒及手足皴裂。

包 装：麻袋、席包。

貯 藏：防潮、防霉。

白 头 翁

別 名：头痛棵，老丈人。

產 地：新乡专区，辉县、修武、济源、沁阳等地，洛阳许昌专区也产。

產 季：谷雨前后（三、四月間）野生。

產地加工：挖出土后，晒干，整理无土即成。

商品規格：不分等級，以个大，稜条均匀，棕褐色，頂有灰白絨者为好。

鑑別方法：本品藥用为其根，呈錐体状，上端粗，下端細。长约6——7寸，頂端有蘆头，头上有灰白色絨毛。个粗者有分裂口，外表棕褐色，外皮有松皮肚、較为皺縮有縱溝，断面有小长孔（与漏蘆相似）。

与漏蘆的區別：漏蘆断面有絲头上有硬鬚，色黃質泡而虛，无灰白絨味腥。

用 途：能清热逐血适用于热病下痢，月經困难及金疮鼻衄等。

包 装：席包。

貯 藏：防潮湿。

白 蕪

別 名：山紅薯干。

產地：洛陽專區許昌專區均是野生。

產季：九、十月間產新。

產地加工：出土後去苗，洗淨泥雜，晾微干，切順片（厚約1—2分）。晒干後，即成。

商品規格：不分等級、大小不等、以白色者為佳。

鑑別方法：本品為白筴的地下部份切成片，狀似紅薯片長約3—4寸，小者1—2寸，寬度大者約寸許，小者約3—4分。厚約1—2分外皮棕黑色，切片的表面（切片面），粉紅色或灰白色，中間多有由上到下凸起的一條菱綫有粉性，斷茬有的有纖維性。

用途：鎮痛消腫。

包裝：席包。

貯藏：夏季嚴防生蟲（放炕箱中，下放硫黃或炭火可數日燃燒一次）。

白 茅 根

別名：茅根、茅草根、甜根

產地：河南各地都產。野生於山地、平地河坡。（河坡地產的最多。）

產季：四季都產，春天產的較多（耕地時犁出）。

產地加工：挖出後去苗及鬚根，以手搗去外皮，晒干即成。

商品規格：不分等級，以外皮搗淨，白色最好。（也用鮮茅根）

鑑別方法：本品是白茅的黃白色細長的根莖，長約1—2尺，粗約一分，有明顯的節、每節長約寸許，短節也有2、3分

者，每节上均有抽皺而成的順条菱綫，节上有时带有鬚根和未去淨的皮毛。有韌性不易断、味甜。

鮮茅根色白，不抽皺、疗效大。

用 途：凉血、止血利尿止渴，近年来用作制糖。

包 装：席包

貯 藏：防水、防潮、干燥保存。

石 葦

別 名：刀箭藥。

產 地：主产于嵩县，洛阳专区其他各地也产。

產 季：霜降以后。

產地加工：采取后除掉根茎，須根晒干即成。

商品規格：不分等級以叶片大，黃綠色，質厚背面有紫紅色孢子囊不帶根为佳。

鑑別方法：本品为石葦之叶，呈长卵圓形一般长约2—3寸左右，具有长的叶柄，叶片較厚，表面暗綠色，背面棕色，往往叶緣向上面卷曲，叶片背面全部密生紅棕色顆粒状的毛絨（子囊群）。

用 途：①收斂性利尿藥，适用于急性淋病，尿道炎，膀胱炎小便出血，淋痛等症。②消肿止血，利尿，益精气，又治淋病及血淋。

包 装：席包或葛条捆。

貯 藏：防潮，防雨。

石 膏

產 地：主产洛阳专区新安县。

產 季：四季均產。

產地加工：采礦時，開出後即成。

商品規格：以色白質堅直絲的為好，臥絲色發紅或青及夾有石塊的次之。

鑑別方法：本品為礦石，色潔白，呈半透明，質堅而有直絲狀之茬，斷面顯光，碎片用手捻之即成粉狀。

用 途：煨石膏、工業原料，用於治乙型腦炎。

包 裝：大塊不包裝，亦有用麻袋包。

貯 藏：置乾燥處。

石 楠 藤

別 名：爬山虎秧

產 地：主產於洛陽專區的嵩縣、新鄉專區的濟源、孟縣、輝縣等地，多生長於石頭縫及梯田地邊。

產 季：秋冬季產、九、十月間產得多，霜打後葉不落變紫色。

產地加工：割下後曬干、打捆即成。

商品規格：不分等級，以帶葉的細藤粗約1分左右不帶根無泥土，無雜質的細藤為好。

鑑別方法：本品是帶葉的藤本秧（莖），莖分兩種，一種紫色，一種灰白色，莖粗細不一，上帶有多數附於岩石上的鬚根，色棕黃似小網。莖上有多數深褐色小疙瘩。葉灰綠色長橢圓形，質稍硬而厚，大葉長約寸許，寬5—6分，小葉很小有似小指甲大小者。

用 途：治骨節痛疼。

包 裝：打捆。

貯 藏：防潮。

石 榴 皮

產地：新乡、安阳、开封、滎阳为主产地，其他各地亦产。

產 季：九月。

產地加工：收集后晒干即成。

商品規格：不分等級，以內皮黃色，皮厚的好，（落地石榴不入藥。）

鑑別方法：本品以果皮入藥，呈不完整的碎塊狀，外為紅色，有黑棕色小點內為黃色有深凹窩（似麻臉）味澀而酸。

用 途：瀉痢、下血脫肛、遺精崩漏、帶下、蛔厥腹痛。

包 裝：麻袋或席包。

貯 藏：防潮。

其 他：①滎陽產的子大，核小，水多，色紫紅，外皮發黑（鐵石榴）個大，過冬不壞，能久存放。

落地石榴，瘦小皮薄，干癟，不能入藥。

②石榴子可催痘。

冬 瓜 子

別 名：冬瓜仁。

產 地：河南各地均產。許昌、新乡、开封等专区產量較大。

產 季：秋后。

產地加工：取出后晒干即可。

商品規格：不分等級，以黃白色飽滿者為佳。

鑑別方法：冬瓜子體橢圓形而扁平，白黃色，長約3分左右。

用 途：利濕、補脾。
包 裝：麻袋包。
貯 藏：防潮、防霉、發黑即沒有用。

冬 葵 子

別 名：兔耆子、牛屎鋪攤棵。
產 地：各地都產，洛陽、南陽兩專區的山區產的多。
產 季：秋季（秋冬產根為土黃耆）

產地加工：將熟時，割了秧打下子即成。將根挖出，曬干為土黃耆。

商品規格：不分等級，不碎的，整貨無雜物的為好，陳后就散。

鑑別方法：本品為扁圓形，由多數種子組成（俗稱磨盤子），土黃色，去種皮後，有棕黃色的種仁。

用 途：滑利大小便適用於小便不利，大便乾燥，水腫及乳汁缺乏等症。

包 裝：麻袋。
貯 藏：防潮。

冬 瓜 皮

產 地：河南各地都產，以鄭州、洛陽產量最大。

產 季：八、九月間產最多。

產地加工：把皮削下後，曬干即成。

商品規格：不分等級，以黃綠色或灰綠色，皮薄無內瓢，不腐爛，不變質的為好。

鑑別方法：為灰黃或黃綠色，不規則，卷筒狀的果皮，皮

薄、質脆、易碎。

用 途：治水肿、消肿。

包 装：麻袋或席包。

貯 藏：防雨、防潮。

半 夏

別 名：藥狗蛋。老瓜蒜（邓县）狗芋头（新野）。

產 地：主产于西峡县、邓县、密县；其他各地亦都有产，野生。

產 季：立夏后产新，割麦后盛产，秋天亦有产。

產地加工：①挖出后，成堆焖下，用手把去皮（此法質量好）也可用脚踏去皮，然后晒干即可。

②挖出后，装入布袋，放入河水中来回撞动，把皮撞去（撞皮时防止中毒，所以在撞时人要站在水流的上游）晒干即成。撞去皮后遇雨天不及时晒干即变黄黑，質就不好。

商品規格：以个大、色白、圓个、飽滿、吸屁股的好。

过去用不同大小的篩子篩选分为三等：

大撰个，头篩子上的，个大直徑5分以上，色白。

二撰个，二篩子上的，稍小，直徑在5分以下，3分以上，色白。

統半夏，二篩下面的，个小直徑平均在3分以下的。

鑑別方法：本品为半夏的地下部分呈扁球形或圓錐形，外表白色，未去皮的部分显黄色，上有凹窩，凹窩周围下方有多数小点，系須根的殘痕（俗称盞眼）切片白色边完整有凹窩。

用 途：去濕、止吐、止咳，鎮咳。

包 装：双麻袋包。

貯 藏：防潮不使发霉。

其 他：①邓县产品圓个粉气足吸屁股門。

②以前有用小南星充假，小南星不呈圓形，沒有虫眼，切片后呈飞边色发紅。

好貨体飽滿发亮，屁股門深，骨气好，質重，切片后不抽小（大撰个酷似婆娘髻）。

③伏貨（立夏时产的）質好粉性大，色白发亮。

秋貨（麦后产品）質次，发泡，切片时不頂刀，切成片后抽縮变小。

半 夏 麩

產 地：河南各地都产。

產 季：四季。

產地加工：半夏片碾成細末，每斤加发面头（酵母种）一两，亦有用切片后的半夏面，用水拌使粘和，做成小块，阴干即成。

商品規格：不分等級，以色黄白的为好，多做成大小不一的长形或方形的块。

鑒別方法：本品为黄白色的块状物，質地疏松，茬虛有很多小孔体輕，而有香味。（用白土滑石磨碎后拌和，作成块充偽的它的質較坚实而且細不易断，体重色发白。）

用 途：化痰。

包 装：紙盒。

貯 藏：干燥、防虫、保存。

代 赭 石

別 名：赭石。

產地：主产于許昌专区禹县、安阳，新乡专区西部也产。

產季：四季均产。

產地加工：本品是矿石，产于矿山，采制方法，是以火藥爆炸，炸下后，打成小块即成。

商品規格：不分等級，以色紫紅光亮，帶鉄釘，断茬分层顏色深沾手的为优，色黑紅不沾手，无釘分层不明显的为次品。

鑒別方法：本品是紫紅色矿石，質堅石体重，沾手，断茬分为多层，新鮮断层很似鉄矿石，有光泽，通体上下两面不同，一面具有多数凹下的圓坑，另一面与此坑相对是多数的乳头样突起。（俗称鉄釘）伪品无此突起，色气不同，顏色不沾手。

用途：止血、适用于吐血衄血、子宫出血、腸风下血、鎮惊、鎮逆可用于惊癇、反胃、噫气、呕吐等症。

包裝：麻袋。

貯藏：防潮。

其他：入藥时，以火煨，趁热放醋中（加一半水）使酥然后碾成碎面。

北 沙 参

別名：沙参。

產地：新乡专区。

產季：春秋季产。

產地加工：挖出后，去苗秧，煮熟后，刮去外皮放竹帘中卷起，晒到八成干后取出捆大把，粗的割开两半。

商品規格：不分等級，以黃白色，条細长，質脆則好。

鑒別方法：本品为細长的根，黃白色，略弯曲，有不明显

的縱皺紋，并有須根之痕迹，質硬易折斷，微甜，不麻咀；若煮不好，會麻咀，粗的割開為兩半。

用 途：慢性氣管炎，肺氣腫，有止咳去痰之效，并用于肺結核病。

貯 藏：干燥保存。

甘 遂

別 名：猫猫眼，猫眼根。

產 地：洛陽专区，靈寶以西產之。

產 季：秋冬兩季采之（冬采之最好，秋季也可）

產地加工：①挖出土之后，趁濕放入竹篩加上小爐渣塊或放入布袋中，于清水中撞去表面的皮（為白色），晒干后即成，有毒有麻手現象（特別手有傷則更易中毒），出土時為紫棕色，撞破后成白色。

②挖出土后，放入篩中，連篩浸入水中，用鞋底搓去外皮，也可用包有布頭的小棍搗去皮，取出后晒干即可。

商品規格：個大色白，肉肥飽滿，光滑。無籠頭須根為佳。瘦小帶皮抽溝者不好。

鑑別方法：本品色白有棕紅色外皮的痕迹，兩頭肥粗中間細小，斷面色白有粉氣，其狀如小花生，質脆。

用 途：主要能瀉水，利濕，可治各種水腫，腹脹，形氣俱實者（忌與甘草配伍）。

包 裝：用小麻袋裝。

貯 藏：夏季最易受潮，虫蛀發霉。過夏時量少可用紙包或小包挂在（廚房）炕上以防虫蛀，有炕房炕之也可，硫黃熏之也可。有毒不能生用之。

生 地

別 名：密密罐根（野生）。

產 地：主产于新乡专区的温县、武陟、孟县、博爱、沁阳等县，许昌专区的西华、长葛等县也产。

產 季：有植（早）种、晚种两种：

1. 植生地——在清明节前后栽种（谷雨后至小满前），收获时间在寒露后出土。

2. 晚生地——在麦收后栽种，收获时间与植生地同。

栽种时不宜连年栽种（否则根生土锈病），最少要5~6年后方能复种。（过去经验）

產地加工：生地出新时，先镰去地上秧苗，然后挖其根，除去泥土，去掉笼头（做来年的种子），运家中后及时加工，不适于久放，如放的天数多，不焙，即身发虚，焙成后粘性少，重量轻，故应随时收随时焙，其过程是：

一、装焙：每焙一般装800~1000斤分大小等级，大的装在一起，小的装在一起，厚度不超过一尺半厚为宜。

二、看火：地黄焙的好否全决定于火力的大小均匀度，火力过大，会焙吹（即使地黄外皮硬，内鼓气，中空，易吹破头）火力过小，会焙流质（即使地黄内汁全流出成油条，干后身黑），因此应注意火力大小及它所引起的均匀度。开始火力应保持55°C（度）~60°C为宜，到快焙成时火力应小些，热度低些亦可，越往后些时间火力越往下降，但也要注意焙簿上火力不均匀现象。

三、翻焙：在装上地黄燃火后，一天到一天半翻一次，以后每天翻二次，随时翻随时检成货，以全身表里柔软者为成货（若外柔软而内硬者还要焙），一般每次焙成一焙地黄约

4~5天時間，使用炭時每一斤成貨約用一斤炭（若用煤，是每斤用煤1斤4兩，時間延長一天）。

附注：①〔附焙火的構造〕火焙是用：土坯構成的，在屋內一面靠牆，築成左右前三面焙牆，焙床的高約4尺左右，長約5尺左右。在前牆土間構一煤火，約3土坯高，焙離地約2.5尺高，架上焙條七、八根，寬窄距離及高度相等，兩端及焙緣邊緣略高些，火力就均勻，分散四方，在前邊留一口準備進入掃地土。

②〔生地加工廠加工〕：將產地加工後的半成品，放在炕上，焙2~3小時以後，使焙得全身變軟，趁熱軟之時，用手攏揉成為圓球形（方法：用一鉄條將熱地黃串起來，在板上，再用另一板壓和擠就成扁圓形，再用手攏成圓形）放在地上涼短時間，再挑不同的規格，給分為4、6、8、10、12、16、20、24、30、40支等，分開堆集。

③〔熟地加工〕：將小生地（小下路）放在籠格上蒸一天一夜（24小時），取出微涼半天，然後用地黃膏（熬地黃之膏）拌均勻一遍，再進行晾乾，即是不粘手時為成，裝在長方形木匣內，上邊蓋用杠杆加壓于蓋，然後打開去木匣，成為熟地塊，以牛皮紙包起即成。裝箱內封存。

商品規格：生地以質重棉軟，外皮細軟，斷茬油潤，烏黑，有菊花心者為佳，皮硬發燥，斷茬發粘，無菊花心者為次，放久後變為干生地時，以斷茬黑亮質重者佳，體輕發泡斷茬不發亮無油性者次。

其規格分為：

4支貨：（四個一斤重）

6支貨：（六個一斤重）（余类推）

8支、10支、12支、16支、20支、24支、30支、40支貨。

40支貨以下者為小生地（又稱“大下路”，50支以下的又稱“小下路”）。

另有不經加工搓圓的，名為“長身貨”。

鑑別方法：本品是不規則的圓塊，通體皺縮不平，表面灰褐色，經加工搓圓的生地，外形略似豬苓，未搓圓的“長身”似干后的紅薯，質重而柔軟，斷面油潤，有棕黑相間的菊花心，有香氣，味甘微甜。

大小依各種規格而異，最大者直徑約2~3寸，最小者（小下路）有如小指頭大小。

用 途：

1. 地黃有補血和血的功效，如胞漏下血、破惡血、婦人崩中、臨床用於貧血及有出血傾向疾病，及婦女胎前產後的疾患有效。

2. 有滋補的療效，治五勞七傷，補五臟，填骨髓，長肌肉，凡是身體虛弱，在大病之後恢復期，用為補血強壯藥。

3. 古人用以治消渴病，適用於治療糖尿病。

生地黃及鮮地黃，治一般熱病有涼血生津液的功用。

熟地黃其性溫補，大都用於滋補藥，腎虛不足、胎產疾病虛弱者可用。

包 裝：內銷為麻袋，出口用雙層麻袋（防潮不損失貨），每包重200斤上下。

貯 藏：防潮（潮後表皮生蟲），埋于干沙中可長期存放不生蟲（生地愈陳愈好），放于干燥地方即可。

其 他：過去有晒干的晒生地，灰黃色，斷茬不黑，油性小，多以小貨晒干而成。

偽劣品：

1. 有用小生地夾入小品或中等品之中而後搓圓成大生地

的，如仔細觀察或手握之即可辨別出來。（經加工廠加工後即無此貨）。

2. 過去也曾有加入石子、鐵塊、泥沙等於生地中而搓成圓的，現已不見。

3. 有用玄參搓圓偽充的，但玄參質硬，手握之不棉軟，斷莖色灰，有筋（纖維性物），現無此現象。

生 姜

別 名：姜，鮮姜。

產 地：魯山、溫縣，溫縣出者最多最佳，信陽、潢川也產。

產 季：八、九月採集霜降以後出之。

產地加工：本品刨出土後，即為鮮姜（可用水洗洗後不能久放）。

商品規格：個大肉肥者佳。

鑑別方法：本品藥用根莖為不規則塊狀物，上有一節一節橫綿紋皮土黃色，內呈黃色有絲，味辛辣。

用 途：主要功效如下：①生姜辛溫發散，臨床用以治傷風頭痛，鼻塞，嘔吐咳逆，去腹中冷氣。

②凡胃逆嘔吐，表寒諸症多用生姜以其能宣達胃氣，所謂生姜治胃，干姜治脾。

③能健胃增進食慾，解飲食毒，又能調和五味為烹調不可少的輔料。

包 裝：竹篾。

貯 藏：注意保存防止腐爛。

其 他：其皮也入藥為姜皮。

玉 竹

別 名：萎蕤、明玉竹、山玉竹。

產 地：洛阳专区、永宁、欒川等县均产。

產 季：2、8月挖出其根入藥，秋产者佳。

產地加工：本品挖出后，洗淨去毛，蒸半熟，經开水輕煮开，晒时尽力用手盘搓之，越搓越亮，晒干即可。

商品規格：不分等級，身干肥大，无毛須，色黄白，半透亮不霉者为佳。

鑒別方法：本品藥用其根茎，为弯曲不直的条状物有竹节状橫筋，上有小疙瘩，橫断面、黄白色，有小白斑点，質地坚而軟。

用 途：补虛：滋阴，治尿頻数，遺精、多汗症，并能治糖尿症。

包 装：麻袋。

貯 藏：干燥通风处以防生虫发霉。

其 他：有两种，有淡黄色質軟有油色光泽，另外有一种則色白而硬无油潤色此可能与地区季节有关。

六 划

全 虫

別 名：蝎子。

產 地：主产于南阳专区的唐河、邓县、方城、泌阳、

鎮平、許昌專區的禹縣，新乡專區的輝縣，信陽專區的礮山。

產 季：從驚蟄（農曆四月份）開始到立秋為止為撲捉時間。

山蝎子：三月後開凍就可撲捉。

伏蝎子：伏天生。

產地加工：

（一）撲捉方法：

蝎子分山蝎和伏蝎兩種。從每年驚蟄（農曆四月份）開始到立秋止，為撲捉時間，其方法是：（1）山蝎子入驚蟄後，白天上山向陽溫暖地方，翻起地面上石頭即可捉到，夜間可在山南坡或刮風的背面，點上一盞耐風燈，待昆蟲聚集，趁蝎子去吃昆蟲時，即可撲捉。（2）伏蝎子（即家裡蝎子）撲捉時間較遲，入伏後（農曆六月份）在炎熱的夜間趁蝎子乘涼和尋食之時，可帶耐風燈一盞，隨帶竹片夾一個（六至七寸長，五分寬）或筷子一對，並準備光滑的鐵筒或瓷罐一個，沿老牆跟尋找（多在背風之處），發現後，速用竹夾子或筷子把它捉住放在鐵筒或瓷罐內（注意撲捉時且勿用力過大，以免夾死蝎子）。

（二）加工方法：

隨收穫隨加工，在加工的方法上：（1）先將蝎子稱後放入清水或少量的鹽水中（每斤活蝎子一兩鹽即可）讓蝎子先喝飽水，然後把蝎子撈出放進鹽水鍋內（每斤活蝎子需食鹽二至三兩）如繼續加工不應換水可逐次減少用鹽量，用大火煮沸約一小時左右，待蝎脊背煮成凹溝或成瓦弧形，變黃褐色時即可撈出。這樣將蝎肚內原有的泥土和喝下的水，全被擠出來，隨時攤在席上涼干（注意不要日晒）方為藥用全蟲。（2）在煮蝎子時候，鍋內的水必須保持寬闊有餘，使蝎子全部被水淹沒為宜，每鍋煮的不宜過多，多了會妨碍煮沸不均、不透，輕者

降低質量，重者容易腐爛變質，不易保存。（3）煮時應注意輕攪均勻，但不可過猛攪拌或翻次過多，以保持蝎子原狀不碎為最好。（4）煮時還必須把日前死去的蝎子，取過來經檢查如無臭味時可單煮一鍋（有臭味者應擲掉）。

商品規格：以中等大小（長約7.5寸）癩肚、身干完整、背部有凹菱者為最佳，其規格有：

青水蝎子：身干、黃色（黃肚），體較輕，陰雨天不反潮。

鹽水蝎子：體較重，表面有鹽霜，陰雨天吸潮變濕發軟。

又以其所產地不同分為：

山蝎子：個大、黑肚、質次（野生于山地，多吃土，所以是黑肚）。

伏蝎子：個稍小，黃肚，質佳（伏天產品，和人工飼養產品，多食昆蟲，所以是黃肚，無土）。

鑑別方法：蝎子是節足動物，周身有13節，額前有二鉗，胸部兩端有足四對，頸胸部短，腹部長，尾部有自衛毒刺。

劣品：（1）過去為增加重量曾有用礞水和鹽水煮者，此品身硬，有礞的滋味，現已少見。（2）也曾有用黃芩子煮者（使色氣鮮黃），現已沒有。

用 途：有去風除濕的效用可用于小兒驚風抽搐，大人半身不遂，口眼喎斜及風濕骨節疼痛。

包 裝：出口貨裝紙盒，每盒一斤，排列整齊。每一百盒裝一木箱，內襯油紙防潮。（裝盒時先噴些涼開水，以便排列時輕輕加壓而不碎，用生水則腐爛。內銷用紙盒或木箱。

貯 藏：置干燥通風處，防虫蛀。

其 他：飼養方法：

蝎子雖是一種野生毒性昆蟲，但亦可轉為人工飼養。河南南

阳一带农民很早固有养蝎子的传统习惯。其形式有两种：（一）在经常不干的池塘中，用砖石砌一个台子，露出水面，在上边盖一间简单的草棚，然后在台上堆砌老墙坯或灶坯，砌好后再把捉来的蝎子盛入棚中，任其繁殖。这种养法好处是，有丰富的昆虫可供作一部分天然饲料，但多因扑捉不便，条件限制，不易推广。（二）唐河县固有“建房饲养法”较为简易成功。这一作法，目前根据供销社近年来推广的经验是，第一年夏季初伏将蝎子下种10斤（中隔一年）到第三年夏末或秋中时，一般可收获100余斤，仅据推广和实际经验体会，饲养的设备方法有以下几方面：

1. 饲养房设备：饲养房亦称蝎子笼。修一间小房，高约5市尺，宽约一丈，屋顶最好建成平房以便于收获，房檐要突出墙壁五寸为宜，防止雨水淋墙；墙壁用旧墙坯或老灶坯砌成，墙的外壁用泥浆搪糊，不留缝隙，不设窗户，以免蝎子随便爬出或其他动物进入伤害；室内地面要铺五寸厚的碱土，砌满旧墙坯或老灶坯（不用泥糊），并在室内留出八寸宽的一条纵横通道是方便饲养和检查，土坯不宜靠实，两坯之间原留一寸左右宽间隔距离，以供蝎子生息活动；墙壁各端离地约五寸高处，各开两个洞口，高约二寸，宽约八寸，直通房内，洞口外面用土垫起，以供蝎子出入方便和流通空气之用（冬季洞口和门户用泥土搪糊严密，以保持室内温度）；前墙中部留一长方形小门，门板制成单扇对外门。（五尺高、二尺宽为宜）关后要严密；距墙基周围约三尺以外的地方挖至一尺宽一尺深的园形防护沟一条，用砖砌后再用水泥或石灰搪糊，以常期不漏水为原则，沟的里沿要砌成斜坡形状，不宜过于光滑，以免蝎子因饮水而跌落淹死，外沿要陡，并且搪光，内沿周围有意栽培野生杂草，吸引昆虫以供蝎食天然饲料。防护沟内在春、夏、

秋之間，一定保持溝水存量，否則因一時缺水而蝎子跑光。修防护溝时，注意应修一个盛水池，以便随时換水和添水，免得水臭或涸干（冬季要将水放去，以免冻坏水溝），修建飼养房时，最好建在住宅附近，以方便管理。

2. 繁殖与下种：飼养房修建完备在下种前先将防护溝灌滿水后方可下种，下种时应掌握雌多雄少的原則。一般雌雄辨別的标准是雌蝎肚大，顏色較暗；雄蝎体量較小，顏色比較鮮亮。下种期前，最好在伏初繁殖期上种，以尽快提高繁殖率，每座飼养房可下10斤左右的蝎种为宜。应注意一次下种。避免二次下种分群互相排斥咬伤；同时更应注意不要給家蝎子和山蝎子混合飼养，因山蝎子个大性野，容易咬吃家蝎子。

3. 飼料供应：蝎子习吃昆虫、碱土，以及磨道粪土、麦片和小谷也吃。（1）夏季夜里可将飼养房門打开，放一盏小油灯，吸引昆虫飞到室內可供蝎子一部自然飼料。（2）因蝎子集中而飼料不足，并要經常在房內撒些麸片或小谷（先与碱土混攪后）等以弥补飼料不足。

4. 收扑方法：收获時間多在秋季，最好是隔一年收一次，收获时必须作好以下工作：首先将前后牆上的小洞口和房檐下的小口塞严，然后打开房門，用酒向室內周围土坯上噴洒一遍，噴罢将門关上严閉一下根据人員多少，把事前准备好的滑光瓷盆放在洞口下边，并准备好盛蝎子的鉄桶或大空缸一口和条帚一把，以备蝎子爬上牆时扫入盆內用。待酒气噴滿全屋后，再把通道口挖开，蝎子就从通道流入盆內，不要等盆內蝎子盛滿，即速用另一空盆放在洞口下，将盛过蝎子盆端起来倒在鉄桶或空缸內，收扑时，人要站在防护溝外，并要穿齐鞋袜，帶上手套，袖口和褲腿都要扎住，以免被刺伤。其次，扑获完毕后，隨即當場注意就地选种，在选种时用竹片夹子或筷子

把过小的幼蝎和适当选出一部大个雌蝎（特别注意选出已带子的老蝎）并选些少量颜色鲜亮的雄蝎，待室内酒气息后，再将选过的蝎种放入室内，以保持繁殖强壮和生产发展。第三，对已收获的蝎子，要注意检查容器，不要因盛的过多压死或盖的过严而闷死的现象，防止加工前造成逃脱或大量死亡的损失。

地 肤 子

别 名：扫帚苗子、千头子。

产 地：河南各地都产。主产于郑州、禹县、新乡等地。家种或野生。

产 季：秋后产新。

产地加工：成熟时，拔下全秧捆成扫帚后晒干，打掉子，筛去土杂即为成品。

商品规格：不分等级。以身干，无土杂，不发霉为好。另有红扫帚子，表皮少发红。一样可以入药。

鉴别方法：本品呈星状扁形的果实，因有黑色稍圆形种子一个。果实大小不一，色灰绿。

用 途：除风湿、利尿，收敛消炎。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮。

其 他：入药时有用微炒的。多半是用生的。

地 丁

别 名：紫花地丁，老婆瓜（指原植物）。

产 地：河南各地都产。

产 季：春季正、二、三月出苗后采之。

產地加工：采后去苗，取根晒干。

商品規格：不分等級，以肥胖、个大、肉紅色为佳。

鑑別方法：本品是地丁的地下部分入藥上部有較軟的蘆头和残茎，上粗下細，体軟有筋，不易折斷，蘆头細長多分枝，上面有窩，或称蘆碗。

有偽品：体長且粗（約一尺余，皮發黑、苗硬、沒有蘆头特別硬，同柴一樣。

用 途：清熱、解毒、治毒瘡。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮。

其 他：洛陽產的多，為白花地丁的根外省也有用苗。

地 骨 皮

別 名：山杞子（枸杞子）根、甜齒牙根、紅耳墮根。

產 地：本省各地都產，禹縣、鄭州、滎陽、汜水主產。

產 季：春秋兩季以春季為主。

產地加工：挖出后去苗，趁濕，用刀將根之外皮分割成小段。再用鋤輕輕敲擊，使皮與心子（骨）分離，把皮剝下晒干。

商品規格：不分等級，以無骨、肥大、無碎末、身干無土為好。

鑑別方法：本品為干燥的根皮通體為卷筒狀，皮松皺，外皮土黃色粗糙，內皮灰褐色，沒有香氣（與五加皮的區別）。

山加皮（杠柳皮）皮緊而細，顏色發紅。

用 途：涼血、清熱、治骨症發熱。

包 裝：席包。

貯 藏：防雨、防潮后發霉。

地 榆

產地：洛陽專區、嵩縣、盧氏等縣產。

產季：秋季（九、十月）產，冬季產的質地好。

產地加工：挖出後，去苗，曬干即成。

商品規格：不分等級，以個大，肥滿，條長，不帶鬚根，沒有莖，莖粉紅色為好。

鑑別方法：本品是地榆的根為棕黑色彎曲的長條（5—7寸，粗2—3分），皮色發黑，很粗糙，質地堅硬，很脆，斷莖褐色或粉紅色，平坦，無纖維性，味苦。

用途：止血、治赤痢。外用治燒傷。

包裝：席包。

貯藏：防潮，置干燥處。

其他：產地榆處多產丹參，蒼朮。

地 龍

別名：蚯蚓、曲蟾。

產地：鄭州、中牟產最多，其他各地亦產。

產季：春季。

產地加工：從河邊或潮濕地帶的土壤中挖出的蚯蚓，用燒過草灰撒在它身上噏死，曬干即成。

商品規格：以身干淨的為佳。

鑑別方法：本品為蚯蚓干燥蟲體。身長4—5寸，身灰黑色，兩頭為圓突狀，一頭稍尖，一頭較圓即是頭部。身有橫紋。易折斷，斷莖可見很多泥沙包于其中。味咸，有腥氣。

用途：清熱、利尿治中風，癱瘓，喉痹，疔傷寒，伏熱狂妄大，腹發黃疸又可作介熱，有舒展支氣管的作用，用于驚

风头痛，高血压，血管硬化。

包 装：麻袋。

貯 藏：防虫置干燥处。

其 他：①香地龙个小，体圆。

②广东产称为广地龙剖开肚去掉泥土。

百 合

别 名：菜百合。

产 地：河南省信阳专区，新县，信阳为主产，是野生。

产 季：霜降后产新。

产地加工：将其根去苗叶，以水洗净（鳞茎）用开水烫一遍，阴干（色白）即成生药。（四斤鲜货出成货一斤。）

商品规格：不分等级，以色白肥大者佳，黑瘦者次之。

鉴别方法：本品体形似莲花瓣，色黄白有微细黄条纹，中间厚，两边薄，略向内弯曲，质坚硬易折断，断茬白色。

用 途：润肺止咳，并能利大小便，可用于浮肿，心下急满等症。

包 装：麻袋。

貯 藏：防虫、置干燥处保存。

其 他：入药时，有蜜炙，生用两种。

百 部

别 名：百部草、鬃虱药、药虱药。

产 地：信阳专区、大别山一带，沁阳山区也产，生在背阴地，野生。

产 季：霜降前后出新。

產地加工：刨出后，洗淨其根上的泥土，蒸半熟晒干即成生藥。

商品規格：不分等級，肥胖者好。

鑑別方法：本品是長条形根。彎曲不直，略呈圓形，中部較粗，兩端漸漸變細，長約4—5寸，寬約2—4寸。外皮多皺縮形成很多順紋或抽溝，外皮土褐色，斷茬白色，肉質，味苦無香氣。

用 途：治虱、殺虫、清肺、鎮咳。內服，外敷均用。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮、防霉。

百 草 霜

別 名：鍋底灰。

產 地：河南各地都產。

產 季：四季。

產地加工：將鍋底上的黑灰扫下即成。

商品規格：色黑質輕，不帶鉄質和雜質的為佳。

鑑別方法：色暗黑，質輕而細，體重而粗的假貨，不能入藥。

用 途：①有止上下諸般血症的功效。如吐血衄血，崩帶下血等症。

②亦有燥濕之功，能消積滯止下痢腹瀉。

③亦可治口舌諸病。

包 裝：布袋。

貯 藏：防潮。

光 慈 姑

別 名：山慈姑。

產 地：洛陽專區欒川、宜陽、盧氏縣等均產。

產 季：秋冬兩季冬季產者好。

產地加工：挖出後洗淨，去蘆頭，鮮時撞去皮，曬干即可。

商品規格：不分等級、個大、色白、堅實為佳。

鑑別方法：本品以地下莖入藥，通體為尖圓形，上小下大，有一個小尖咀，色微黃形似韭白，質堅韌白，有長橢圓形的心，本品不分瓣，屁股門光，沒有味。

用 途：敗毒，產後血悶攻心。

包 裝：小布袋、麻袋。

貯 藏：防潮、防霉、防蟲。

竹 茹

產 地：主產密縣（出竹筴最多），清化、禹縣也產（出竹蘭）。

產 季：常年都產。

產地加工：用新竹杆（比舊竹杆泡後好）做竹筴竹蘭時刮下之竹絲曬干，打包即成。

商品規格：身干絲細，無竹批，竹頭，握之不刺手為佳。

鑑別方法：本品為竹器生產刮下的竹絲，為乳黃色，狀似亂麻，質輕柔軟，干後近白色。

用 途：清熱。

包 裝：捆大捆、外銷加麻袋或席包。

貯 藏：防雨。

艾 叶

别名：艾。

产地：河南各地均产，分家种、野生两种。

产季：五、六月间出新。

产地加工：割下晒干撬下叶子即可，（叶子干后也不易碎。）

商品规格：不分等级，不发黄，灰绿色为好，梗多的为次。

鉴别方法：本品是艾的干叶子，质绵软，不刺手揉之不易碎、叶上面绿色、背面灰绿色；有特异气味。叶用力揉搓成艾绒，搓后见火即燃发白烟不易灭。也为特点。艾叶有两种：艾叶花：叶稍长，口多（边残凹多）。大叶艾：叶稍短，少。伪品：驴尾巴蒿：无味，点之不易燃，叶薄。

用途：1）具有止血安胎的作用，临床适用于吐血衄血，脓血痢，妇人胎动漏血等症。2）针灸药作灸用。

包装：席包。

贮藏：防潮 防雨。

車 前 子

别名：車帖韃棵子、猪耳朵棵子，旱車前，牛舌草。

产地：许昌专区的禹县、郑州、南阳、信阳等地。

产季：八、九月产。

产地加工：割下黑穗晒干、将粒搓下去杂质及灰土、干净后即成。

商品规格：不分等级、以干净无沙土、不霉、色红棕者为好。

鉴别方法：旱車前子个小，表面光泽，色棕红，体上有一盅眼

(小白色点)，为用水或唾液濕之，发强粘性。以手握后，可粘一手車前子。

商品中易混入的有：

水車前子——体个大、黑色、有虫眼。

荆芥子——沒虫眼，个大色青黄，遇水不粘。

广西天仙子——外形与旱車前子一样，色稍紅，沒虫眼。

用 途：利尿、治腹泻。

包 装：内襯白布袋、外用麻袋。

貯 藏：防潮濕、否則过水后、就粘成一块。

决 明 子

別 名：草决明、蝎子肚、馬蹄决明。

產 地：主产新乡专区，許昌专区的禹县、长葛也产。

產 季：春种、秋收。

產地加工：秋后、角果黄熟时連秧割下晒干、打下子、篩去土杂即为成品。

商品規格：不分等級，以黄綠色，飽滿者为佳，色黑棕不飽滿者为次。

鑑別方法：本品光滑、坚硬、形似馬蹄、外皮黄綠色。将数个决明子按头尾順序排列起来，則很似蠟尾、故名蠟子肚。

用 途：治风湿目赤，目痛，头风，头痛。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮，防雨（雨淋后发黑）。

其 他：炒后，破皮的决明子，則易生虫。

赤 石 脂

產地：主产許昌专区的禹县，新乡专区的济源。

產季：四季都产。

產地加工：与矿产相同，先将地挖一个洞，而后进入采挖。

商品規格：以肉紅色（里外一样）光滑細膩，柔軟，易折断的为好，茞白的称为“外茞”是次品不作藥用。

另有白石脂：白色、光滑、也入藥。

鑑別方法：本品为矿石，光滑細膩，粘舌头性很强。安徽产的肉紅色，質泡易折断，断茞带紅点，过夏后成面（粉末）。禹县产的肉紅色淡，質稍硬。

用途：透濕、止血、治痢、外用生肌长肉。

包裝：麻袋。

貯藏：防潮。

辛 夷

別名：春花、毛桃，木笔花、辛夷花。

產地：主产南阳专区南召，西峽、均系野生的小灌木。

產季：十一月产，立春后即开花，不能再采。

產地加工：腊月时，待树叶全落完后，用繩子将枝条围捆在一起，上树用剪子把花头剪下，下面用布接收，采回后，成堆放置使里面发热，然后摊开晒，晒后再成堆放置，使发热摊开再晒，这样重复几次即能全干（直接用日晒不易干）。

商品規格：不分等級，以无把，身干，不破头完整，个大，飽滿的为好，一般可带柄，出口的全为不带柄的淨貨，去柄时要用剪子，防止花散。

鑑別方法：本品为干燥的花，呈毛笔样的形状，外面密生灰黄色有光泽的絨毛，質脆，剥开內层还是有灰黄色的絨

毛，最内层有一棕黑色的花心，气味很香，而辛。

用 途：除风、通鼻、作香料。

包 装：席包，葛条筐。出口用木箱装（100斤上下）。

貯 藏：防雨。

芒 硝

別 名：皮硝。

產 地：主产于郑州，中牟，开封，黄河南岸其他各地亦都出产。

產 季：春冬两季。

產地加工：把盐鹼地上所結的白霜，扫取溶化，过滤蒸发再結晶即得。

商品规格：不分等级，以色白粒大的为好。

鑑別方法：本品为半透明之結晶体，放置空气中，則漸风化成白色粉末，能溶于水，味苦咸。

火 硝：呈牙白色，顆粒較大（柱状結晶），硝盐均呈粉状。

用 途：蕩滌内热，食积及停痰宿食。

包 装：布袋或麻袋。

貯 藏：易风化，严防风吹，日晒。

防 風

別 名：水风，水防风。

產 地：以汜水产品为最好（条大色白軟苗）洛阳专区、新乡专区、产量較多，其他各地也产，野生。

產 季：春秋冬都可產。

產地加工：挖出後去苗，曬半干，捆成小把，再曬全干即成。

商品規格：不分等級，以條長、光滑、勻稱，白色不帶蘆頭的為好，我省產品以汜水產品為最好，條長色白，苗軟（無硬苗貨）俗稱“大白條”。另有質硬、身堅、色氣發黑的硬苗貨，俗稱“水風娘”是次品。

鑑別方法：防風是細長的根，長約4寸——1尺，粗約1—3分，色黃白多為單枝，少有小叉枝，體軟略有彈性，易斷。斷茬黃白色，中間有黃色花紋，味微甜。王范產品色深，斷茬或切片中間花紋顏色發紅，濟源產品蘆頭大，條短。

產河北省的稱為“口防風”條大色灰，皮松質量好。

用 途：驅風，除濕。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮，見潮生霉，腐爛。

其 他：藥行加工，買到產地加工後的防風，打開捆噴上水使上潮，重新用葛條捆成小把，每把一斤重，切去蘆頭，再曬干即成。

谷 精 草

別 名：老翻袋。

產 地：河南各地皆產，鄭州為主要集散地野生。

產 季：四月出新（麥頭——麥收前）、多生于麥地。

產地加工：割下曬干打成把即可（也有不打成把）。

商品規格：沒有根，草黃色，無土無雜為好。

鑑別方法：本品以全草入藥全草長約6~7寸為黃綠色。草很細有節，節上生有長圓形葉，對生，在節上分叉處生谷子

状的小球（果），果实压破有多粒极小发红色的种子。

用途：清热明目主治各种眼病亦治感冒、头痛等症。

包装：席包。

贮藏：防潮，受潮变色。

旱 蓮 草

产地：河南各地均产，野生。

产季：秋后，秋产的颜色较绿（收割季节过期变老质量降低）。

产地加工：挖出后，把根切去，晒干后即成。

商品规格：不分等级。

鉴别方法：本品为一年生草本植物，高约1—2尺，梗分小枝，叶对生质稍厚，披针形，叶边沿有锯齿，断茬可流出多量液体，该液遇空气立刻变黑色，自小枝顶端，开头状花，所结果实形如莲房黑色。

用途：养阴、凉血、适用于吐血、衄血、血痢、肠出血、子宫出血，取汁涂眉髮能促进生长。

包装：席包。

贮藏：防潮，干燥保存。

皂 角

别名：牙皂、小牙皂。

产地：主产于新郑县。禹县。登封及其他各山区都产，野生。

产季：秋后产新。

產地加工：秋后果实成熟（为棕黑色）采下晒干即成。

商品規格：以肥胖中个的为好（二寸长上下），太大的不好，瘦小身干的或霉烂破裂的为次品。

鑑別方法：本品系弯曲成弧形的角果。內曲的側面有突起的菱綫，体长约2寸，寬約2~3分，厚約1.5~2分外皮深棕色，有的帶有褐色細小的裂口，外皮光滑。質堅發亮，花黃綠色，莖質松軟，沒有子，有豆腥氣味，吸入皂角粉后打噴嚏。

用 途：開竅，消痰殺虫。

包 裝：麻袋、席包。

貯 藏：防潮。

其 他：山東產品，外形与河南產品相似，但个大（长约3寸以上寬約3分）稍扁，不如河南產品堅實飽滿。

一般皂角是指“大皂角”（长4—5寸以上）而言，体中有子不作藥用，但其子也供藥用。

皂 角 刺

別 名：皂角挖針、皂刺。

產 地：河南各地都產，野生。

產 季：秋季產。

產地加工：用鏟子將刺針鏟下晒干。

商品規格：以淨刺不帶枝棍，紫黑色者為佳。隔年的刺色發黑，質干切片后質發泡質量就差。

淨片：都有皂刺切的片，沒有圓片，都是斜片，均有癍心。

毛片：有一部份小枝的片，枝片是圓片，不癍心，質重。（以禹縣宋樓切的片最好）。

鑑別方法：本品以皂角的枝条入藥長約3~4寸許，枝上分歧生小刺，分歧生小刺，尖銳鋒利，下部略扁，呈紫紅黑色，有毒。

用 途：治瘡、介毒、下奶。

包 裝：竹篾。片用席包。

貯 藏：防潮濕，受潮后生霉。

杜 仲

別 名：棉樹皮。

產 地：洛陽、南陽二專區。

產 季：四、五月間。

產地加工：農曆4—5月間剝去其外皮，用木板將皮壓平，刮去上面的粗皮，剛剝時皮是青白色，干后色紫紅為佳，修理整齊即成。有些地區不經過刮皮壓平工序（洛陽地區）。

商品規格：以身干、皮厚、不朽、不霉為好。

鑑別方法：本品為扁平的板片或卷片狀的樹皮，外皮呈淡棕灰色，有縱裂的槽紋及斜方形橫裂的皮孔，內表面暗紫紅色，光滑。質脆、易折斷，折斷面有無數白色富彈性的膠絲。

用 途：①強壯藥、治腰膝痛。

②腳痛不欲踐也。

③國內外皆有人用10%左右的杜仲酊，治療高血壓症有效。

包 裝：打成捆后用席包。

貯 藏：防潮、防發霉變質，置干燥通風處。

何 首 烏

別名：首烏、黑首烏。

產地：嵩縣、欒川、盧氏產，而以嵩縣盧氏產者為好。

產季：十月及二、三月皆可採，冬採者好。

產地加工：挖出後，除去土及秧苗須根等，曬至六、七成干，用力橫切成一寸半長小塊，曬干即可。

商品規格：以個大不凍，有菊花心、不霉，色黃紅，粉足為佳，身虛帶筋者次之。

鑑別方法：本品為首烏的地下部份，長四至五寸，有縱溝帶稜，質堅、斷面為黃白色突起，商品多切成片子出賣。

用途：補肝益腎的強壯藥，適用於神經衰弱、夢多、遺精，病後虛弱，養血去風，解毒藥等內外科皆用。

包裝：麻袋。

貯藏：防潮。

其他：①本品分生熟兩種熟用於切片（蒸數遍）。

②本品初出土時，長約四、五寸圓形，有長稜形，有縱溝，斷茬成梅花形。

芍藥

別名：芍藥根。

產地：商丘。

產季：長3~4年，（過去七年才收）收挖季節以夏天（七月初）出新。

產地加工：將沒有開過花的芍藥（當花蕾長成則立即打去以防影響根頭質量），根挖出之後，放入鍋中煮沸幾次（糊一下）時間應掌握好，時間少斷茬白（沒熟透），煮之過火則太爛成了爛紅薯狀。當糊好後取出少涼，立即刮去皮，曬到皺皮

再堆起悶到出汗，然後擺開再晒，晒皺皮再堆起直到汗出透為止，最後晒透晒干即可。

商品規格：一般貨皮光滑，沒有疤，斷面平滑，切成片光滑，易碎，不炸心，不黑心（黑心則為花片）即認為是好貨，外皮有順溝皺縮紋多粗細不均，炸心，色黑切片成花片則次之。

鑑別方法：本品是去皮的芍藥根，通體光滑似塑料，色呈肉紅色（其外皮已除）間有支根的殘痕和盅眼（須根痕），斷面茬稍白，有一淡紫圈（皮層部分）當相互撞打發石聲，質堅硬，不易折斷。

用 途：主要有：①有和血散血，通經的療效，能散惡血，破堅積散邪行血中之滯。②白芍藥：緩中收斂，有鎮痙，鎮痛的作用。

包 裝：箱子、花片用席包或箱子，竹篾也可。

貯 藏：防潮、防蟲（易蟲蛀）。

其 他：①本品無假貨，目前市場所見有：

赤芍藥：皮紅色（較河南貨色深）質堅實，體重。

川芍藥：皮淡紅色（較河南貨色深而較杭白芍淺）水色差於杭貨。

河南產：兩頭見刀（二頭都用刀切過），水色好（切開茬白）質堅池。

②過去分大頁面王，大頁面，頁面，二頁面。

大頁面王——約有寸許粗，兩頭齊，光滑均勻，但此種很為少。

見。

八 划

夜 明 砂

別 名：蝙蝠屎。

產 地：主产于新乡专区济源，南阳专区内乡等地的山地石洞中，其他地区亦产。

產 季：四季都产，多产于夏秋两季。

產地加工：本品是动物蝙蝠的尿，蝙蝠多棲于岩石洞中，或屋檐处，有經驗的藥农，到山区寻找其洞收来之。

商品規格：不分等級，无土、无杂质、質輕为佳。

鑑別方法：本品两头尖的顆粒或粉末咖啡色并有发亮的明点（是未消化的虫壳，虫眼，）質輕，不粘手。

用 途：活血明目、泻热、疗惊疳用眼科、小儿疳积藥。

包 装：麻袋。

貯 藏：防水、見水后即成块。

夜 交 藤

別 名：首烏秧、首烏藤、何首烏秧。

產 地：南阳、洛阳二专区。

產 季：秋冬两季較好，春季也产。

產地加工：割下后，打成捆，晒干即为成品。

商品規格：不分等級，以身干不霉粗在1—2分許的为

好。

鑒別方法：本品為何首烏細長的蔓生莖，沒有葉，有小的枝條，有細節，有扭曲的縱槽紋外皮紫紅色，質脆易折斷，斷面淡黃色，有菊花紋和白色的心。

用 途：治陰虧。寧心神。

包 裝：打捆後席包。

貯 藏：防潮，吸水後發霉變黑。

刺 猬 皮

產 地：開封專區、中牟、鄭州、為主產地（多生于荒地）新鄉專區也產。

產 季：四季均產，麥收後到初秋時產的最多。

產地加工：動物刺猬多在晚間出來尋食（棗、花生等），所以多在晚間撲捉，撲得後，以石碾碾死，同時把其肉壓出來，剝去其肉，取皮填入爐灰渣或青灰，放五六日即乾。本品皮內油脂很多，不能日曬此法油質都被爐渣吸乾，除去爐渣即為成品。

商品規格：不分等級，大小和新陳。以體乾無油不生蟲，無爐渣的為好。

鑒別方法：本品是刺猬的皮，周圍多向內卷曲，或有對折而成，皮外密生堅刺、長約5分左右、有黃白色、灰白色等，多是花色。皮內面帶有油膩性的爐灰，有特異臭味。

用 途：解毒、治痔瘡、治反胃。

包 裝：筐篋裝。

貯 藏：防潮（見潮後生硬頭蟲，刺脫落），放炕房中最好。

阿 膠

別 名：长八块，黑驴皮胶。

產 地：河南禹县为主产地，近来郑州也产。

產 季：秋冬春三季产。

產地加工：

(一) 成分：驴皮100斤，豆油15斤，白糖15斤，酒（绍兴酒或以白酒代之）7.5斤。

(二) 操作法①将驴皮放于池中，用凉水泡两天，用园刀刮去毛及皮内的残肉，洗之，再放入河内浸泡用扫帚刷几次，除去表面的污物，再泡软用刀切成小块，用鹼水（用沸水1000斤，鹼半斤）除去其上杂质及污物，然后分三锅煮，分几次抽取汁，在此同时除去上层的泡沫，第一次取汁是在煮24小时之后，取出之汁，过滤于缸内，1000斤驴皮所得之汁加二两白矾（沉淀杂质）静置1小时，再放于锅中加热浓缩到原体积之半，停火在锅中静放5——6小时，然后用冷水漂去上层沫，直到沫变细腻呈黄色，就可下白糖过筛，约经10小时，再加酒拌均，再隔一小時左右开始加油，（此时可去火）当油搅开（即与胶很好混合之后），取出倒入匣中（模型中）冷却到用手压不动则可。

②将冷凝好的大胶块，用锋利的刀切成大条，再依要求切成一定的小块。放于帘上晾干（日晒则变软而流失，离地太近则受潮而变软）晾到四成乾再翻一下，再乾到七成则可。收起后放于结实的箱子内（因反性而变软膨胀）使之整直再闷三天，取出于帘子上凉到近乾（此时不再弯了）而后烘乾即可。烘乾室最初为20°C，两天后加温到35°C—40°C放5天，最后加到60°C（冬天）取出放于阴凉地方，使之变硬。放置

2—3月可以出售。

胶出厂时冬天用温水擦之，夏天用冷水擦之；使表面光亮美观，最后打印包装即可。

注：杂质除净与否是保证阿胶质量的关键。

商品规格：阿胶以黄棕色，半透明，发亮，光滑，细腻的为好，质粗糙，色乌不亮，过夏时粘在一起的为次货。河南产品多为八块一斤（俗称长八块）。山东产品多为16块一斤，过去有依大小块不同分为福字，祿字，寿字三种规格。

鉴别方法：阿胶是驴皮熬成的胶，为长方形胶块，长约2.5寸，宽约1寸，厚约1.5—2分，或3分上下。棕黑色半透明，断茬光亮，有臭胶气味，入口微甜河南产阿胶块厚，色黑发乌，表面较粗糙，不光滑，多有细微的裂纹，目前质量也在提高接近于山东产品的标准，山东产品起明发亮，细腻油润，半透明，对光看之呈棕红色。

用途：补虚，止血，滋阴，润燥。

包装：纸盒（一斤重）装箱，（内衬棉纸，油纸，外加血料）。

贮藏：防潮。

青 黛

别名：靛沫。

产地：主产在许昌专区的禹县、长葛。新乡、信阳专区各地也产。

产季：靛分为早晚两种，早靛3—4月栽（多种大麦茬），伏天产新。晚靛秋后栽，立秋时产新。早靛质量好，产品色深。

产地加工：正品的青黛应当是在捣靛时，上部浮起的沫

子，收集后晒干所成。但一般均是用靛晒干后当青黛入藥。搗靛的方法是将收割后的小藍(靛)放靛池中浸泡2—3天(天冷时要泡四天)泡到将靛秧提起流下之水成絲时即算泡好，捞出秧后，于池內加入用青石燒成的靛灰。然后用扒子等物在靛池中攪动，此即称为搗靛。搗至靛池中之水放置后可澄清时即算搗好。放出上部的水，取下部糊状物在布单上濾去水，放缸內，即为成品靛，取出靛晒干即是青黛。

商品規格：不分等級，以色深不发黑的为好。

鑑別方法：青黛是青灰色粉末，質輕粉細(可作染料)有特殊气味，真正靛沫所成的青黛深青色，不发灰，放鉄片上，下部以火燒之，可全部揮散，不留一点残渣。靛作成的青黛色发灰，如上法燒后有残渣存在，另有伪品是染布后的打底加洋藍所成此貨色鮮質重，粒甚粗。

用 途：①清熱消炎介毒藥，外用于各种口腔炎，急性喉头炎，扁桃腺炎。

②泻肝，散郁火，治惊癇及諸虫蛇咬伤。

包 装：紙封(一斤或5斤)

貯 藏：防潮貯存。

青 蒞 子

別 名：野鷄冠花子。

產 地：河南各地都产，許昌产量較大，野生。

產 季：8、9月后产新。

產地加工：种子成熟时将全株割下晒干，然后用木棒敲打(下置布单)。使种子脫落，篩淨浮皮及雜質即可。

商品規格：不分等級，以淨无土为好，新貨色黑亮。

鑑別方法：本品是野鷄冠花的种子入藥，是扁圆形的小粒，基部有凹陷，質不堅，黑色有光澤，內部有白色的仁。

用 途：治肝熱毒赤眼翳腫等症。

包 裝：內布袋，外麻袋。

貯 藏：干燥处保存。

其 他：陳貨色暗，入藥的均為野鷄冠花的子。

青 木 香

別 名：馬兜鈴根。

產 地：主產在嵩縣，魯山等地。

產 季：秋冬兩季。

產地加工：青木香藥用其地下根部，先采其根，晒干即成。

商品規格：不分等級，以身干個粗大，獨條肥大，質堅土黃色為好，細小分叉為次。

鑑別方法：青木香通體作圓柱形，或略帶扁形，長短不一，長約2—4寸，長可達尺餘，粗約2—5分，稍帶彎曲，外皮青灰色或土黃色較光滑，稍有小點的突起物，有細的縱皺紋，并有橫裂的皮孔，質脆易折斷，斷面粗糙內心為白色，起粉，周圍有一圈很明的黑圈有車輪狀花紋，細看有小孔，香味很濃。

用 途：行氣、止痛、祛痰、止腹痛。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮（受潮變黑）。

其 他：青木香生于山上，結果叫馬兜鈴，根長尺餘，大姆指粗，灰黃色，切開略似防已花紋，身無筋，干脆易折斷，有香氣，味類似木香，故稱青木香。

青 風 藤

產地：主产于嵩县，野生。

產季：秋冬两季之交收之。

產地加工：用刀将原植物上割下，去皮，晒干即可。

商品規格：不分等級不朽不腐，干的为好。

鑑別方法：本品是青风藤干燥去皮的地上茎入藥，外觀似木通，体呈黄色，間有白色扭曲的筋，筋与筋之間的木質松软易剝落，还有深土黄色的叶基痕迹，断茬有均匀的小孔，有車輪状的花紋（輻射状）深陷的溝，中心有木質黑色园心，直切片絲不順，皮粗帶白筋其两端处都有炸口（其外皮为黑色，薄似紙），本品粗細不一，河南一般用細的。

与木通之区别：

木通沒去外皮，外觀黄色，断茬沒有园的木質心，和扭曲的筋，可吸上水来，沒有炸口，切片不易碎。

用 途：活經絡，除风。

包 装：打成捆。

貯 藏：防潮，受潮发霉变黑。

青 蒿

別 名：黄蒿、蒿子。

產地：河南各地均产，野生。

產 季：八、九月間产新。

產地加工：割下后阴干即成。

商品規格：不分等級，以青黄色，穗多，杆青，有清香味的为好。

鑑別方法：以青蒿的地下部分入藥，全草綠色，茎杆长；

2~3尺，呈圆形带纵沟，有直稜线，质坚硬，叶羽状分裂，断茬白色。

用 途：解热，外用杀虫。

包 装：打捆后用席包。

貯 藏：置干燥通风处，注意勿使其霉烂。

金 釵（附假品黄草）

別 名：金釵石斛，石斛。

產 地：主产于西峡，信阳专区，洛阳专区的卢氏嵩县，栾川以及大别山区。野生。

產 季：四季都产，以秋产为佳，春产已出苗为次货，质重瘦小不易折断，叶狭小披针形，厚似竹叶，叶干慢慢掉落。

產地加工：野生于高山悬崖，甚至山下有水，就借水反射阳光照射后才能生长（太阳直照及早地无水之处都不生长）。

采时人系在绳子上吊下荡入悬崖进行采取。选龙头凤尾青黄色为佳，放笼中蒸约五分钟取出凉干，用手搓去浮皮、即成黄亮之色。

商品规格：以肥胖金黄色，有龙头凤尾的，身圆不扁为好，长约1寸许（弯曲）粗约1分许。

鉴别方法：细长弯曲、头上有须根、尾细（俗称龙头凤尾）、金黄色，呈圆形、其上有明显的纵皱纹，放口中咬，越咬越发粘无渣。

用 途：（1）有退热作用，临床用以治温热病的发热自汗逐皮肤邪热。

（2）有帮助消化增进食欲的功能，能补五脏、虚劳、羸

瘦、强阴、益精、久服厚腸胃。

包裝：木盒或鉄盒（一斤上下）

貯藏：防潮防虫。

假品：用細黃草加槐子水染成金黃色（或不染）卷曲后假充金釵其色比金釵黃，无头、尾、两头齐，纖維性，不易折斷色淡些，入口咬有渣。

金 銀 藤

別名：銀花秧，二花秧。

產地：主产密县及新乡专区，尉氏。南阳等地亦产。

產季：秋冬二季。

產地加工：割下后晒干即成。

商品規格：不分等級，以干淨不帶土的为好。

鑑別方法：本品为細长的条，体輕心空，沒有叶杆的，外皮呈紅色、皮松且容易脫落，內皮帶有黃色的毛茸味苦。

用途：清熱解毒。

包裝：打成大捆。

貯藏：防潮。

金 櫻 子

產地：主产南阳专区，野生。

產季：秋末冬初产新。

產地加工：金櫻子是蔓生灌木，多攀于其他植物生长，枝干均生密刺，叶有光泽，秋季結鮮紅色果实，形似刚脫花的小石榴，而稍长，霜打后叶均脫落，摘取果实晒干即成。

商品規格：不分等級，以色紅黃，飽滿，个大的为好。

不熟时摘下的果实色淡不饱满。

鑑別方法：本品是暗紅色的果实，略似南山楂，色稍黃，身稍長，果实內有多数菱形黃褐色种子，外附細微的白毛。梔子与此相似，但外皮有菱綫，色紅黃，皮薄，內部为紅色。

用 途：治遺泄，成为收斂藥。

包 装：席包。

貯 藏：防潮（見潮发黑）。

金 蒙 石

別 名：礞石。

產 地：新乡专区，輝县产最多，禹县亦产。

產 季：四季均产。

產地加工：采集后即成，不需加工。

商品規格：不分等級，以无土淨的为好。

鑑別方法：本品为金黄色的矿石，碎面有閃光性光泽，体質很重。有泥土的用手研后，不閃光而呈暗色。

用 途：①能降气，行滯，可用于小儿的急慢惊风，腹中积聚刺痛等症。

②为治惊，利痰之圣藥，定喘止嗽，一切痰疾。

包 装：布袋。

貯 藏：防雨，不应露天存放。

蘆 芭 子

別 名：葫蘆芭子。

產 地：主产在商丘专区，家种。

產 季：秋季。

產地加工：深秋（八、九月）种子成熟后，为采取期，割取全草晒干，搓掉种子，簸淨即可。

商品規格：不分等級，以飽滿个大无雜質为好。

鑑別方法：本品呈稜形或类椭圆形，棕黄色的种籽，表面有一条凹溝痕，質堅味苦。

用 途：主要能補胃、除寒，祛風止痛，为緩和滋養剂治疝痛腹痛。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防潮、防霉。

蘆 根

別 名：葦子根。

產 地：河南各地都產，多生于河溝边上。

產 季：春季盛產。

產地加工：挖出后，除淨須根及苗，用水洗后晒干。

商品規格：不分等級，以色白、条粗、身干不霉的好。

鑑別方法：为长条形的根茎、有节、中空、体輕、質柔韌不易折斷，外皮为黄白色，有光泽及明显縱条紋。

用 途：如利尿、介毒藥并有清涼鎮呕作用，用于一切热病口渴，能溶介胆液凝石，治黄疸，急性关节炎等。

包 裝：打成捆。

貯 藏：干燥保存。

佩 蘭

別 名：佩兰叶，香佩兰。

產地：主产于信阳专区，野生。

產季：秋季八、九月产，霜降后叶变黄，应趁霜降前叶綠时采集。

產地加工：連根拔下，捆成小把，晒干即成。

商品規格：以身干、叶多、叶大、色綠、无根、味长的好。

鑑別方法：本品是带根的全草，高約尺許，杆（茎）黄褐色圓形，有节，节上对生有椭圆形叶，叶綠色很薄，吸潮后变軟，叶长约5—6分，寬約3—4分，有特异的香气，略似怀故子味，上海来的貨“香佩兰”杆稍粗长，无根，叶稍大而多，捆的整齐，味气浓。

用途：芳香、健胃、发汗、利尿。

包裝：打捆后，外包麻包。

貯藏：防潮，見潮发黑。

知 母

產地：主产于新乡专区的源曲。

產季：春秋两季出新，以秋产者質量好。

產地加工：由土中挖起后，去淨泥土及苗子，放秫秸制成的帘子上，凉晒，全干即成毛知母。挖起后以刀刮去皮后晒干者为知母肉。

商品規格：分为知母肉和毛知母两种。

知母肉又分为：大知母肉：質硬体坚，粗細同指头，皮黄白色，体飽滿，抽溝淺。

小知母肉：粗細在2—3分以下，色灰白，抽溝深。

毛知母分大小二种，大的长3~4寸粗似指头，茬白，饱满；小的粗在2分以下，以色黄，有肉气，不空心的为好，发霉后变黑，质泡空心。

鉴别方法：本品为扁圆形长条的根，多弯曲，长约3~4寸，粗约2~3分。毛知母外部有金黄色毛茸，多按一面生长。知母肉，无皮，无毛上有刮过的刀印，顺体长有一列小点（根痕）质坚硬，断茬白色。

用途：止咳、清肺热、主治烦热、消渴、劳热、骨蒸、大便燥结，小便不利。

包装：篾装、席包都有，知母肉装箱。

贮藏：防止发霉。

其他：河南产品瘦小，不能去皮做知母肉，只产毛知母。

芫 花

别名：头痛花。

产地：主产于嵩县、密县、系野生。

产季：春、夏两季皆产，亦有在2、3月间采者（花未全开）。

产地加工：当花未全开时，连叶带花，撸下放于薄上，晒干即可。

商品规格：不分等级，以干净不霉，无杂花，未全开者为佳。

鉴别方法：呈细小弯曲的小花，全长约有2分许，花呈棕红色，花筒呈灰白色，其上密生白色短绒毛，全花较软，无臭无味。

久臭則有刺激性，使鼻腔发热的感觉。鮮时花呈紫兰色，花很小，心为紫色。

用 途：消肿、利水，可治水肿腹水，面目浮肿痰飲胸肋痛喘滿等。

包 装：席包。

貯 藏：防潮。

其 他：本品有毒。用陈久的最好。

花 椒

產 地：密县为主要产地，南阳、洛阳两专区亦产。

產 季：8—9月采集（六月六开始剪椒）。

產地加工：由树上用剪刀剪下，晒干，过篩，除去种子即可装包。

商品规格：个头大皮厚色紅，无黑子沒把（柄）为佳。个小色青为山椒則次。

鑑別方法：本品为赤紅色球形的果实，通体有小的突起，后有一长柄，晒干之后，果实多裂开分为两瓣，內有两个半球形的黑色种子，果实內皮也有一层很薄乳白色的內皮，种子切开后內有白色的仁含有脂肪油。

本品吃之則感到咀舌发麻，嗅之有辣味。

用 途：溫中止泻燥热杀虫，适用于胃部及腹部冷痛呕吐便泻等症。

外用煎水洗脚气及溫疮。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮，受潮生霉，則气味不好。

其 他：几种花椒的比較。

西花椒：大紅袍，个大，沒有把，产西北（陝西）。

川西花椒：个大皮薄，气味不正常。

河南湖南花椒——皮薄（平地产）皮厚，（山地产）个小色不太紅，有把和枝。

青椒——青色。

其子入藥称椒子，椒目。

在商品中以“大紅袍”为最佳。

花 粉

別 名：天花粉，括箕蛋根。

產 地：河南各地都产，主产于洛阳专区、商丘、开封、安阳等专区亦产，家种，野生都有。

產 季：冬春二季。

產地加工：挖出后，去蘆头和須根，把外皮刮去，显现黄白色，直切成二寸长的块，然后晒至八成或者全晒干，放置竹箕或荆条箕中，如入碎紅片，撞去黄色层变白色即成。产品最怕受冻，冻后質变虛，色发青，筋大，断茬有蜂窩。

商品規格：以白色，通体沒有抽溝，肥胖，粉气足的为好。分：花粉王；即大2 3寸以上（方或园）粉气，足色白，質重，断面沒有筋，最好者似面粉。

統花粉：不分大小，粉气不足。

別鑑方法：本品是括箕的地下部分，白色园柱形，方形或切为兩瓣的硬块，含粉量多，外皮帶黄色，最大的多似碗口大小，断茬粉質。不光滑，-有鮮黄色周边有較多成束的小孔。味甘，断茬有裂隙的是受冻的次貨。

用 途：生津，止渴，清热。

包 装：席包。

貯 藏：防潮貯存（見潮后发霉）发霉后不能見水，可再行干撞。

其 他：霜降以后产新，冬产品最好，春天产的粉气小筋大。种后年久的产品好，产花粉的是雄株，雌株只产括囊不能采花粉。

芡 实

別 名：鷄头子。

產 地：主产于信阳专区的信阳、息县、罗山、潢川、新县等地。

產 季：秋季产新。

產地加工：生长在深水中，叶茎果实外皮都生很多硬刺，用刀在芡实的茎上端割掉果实，然后用泥把外壳搓去。切开后挤出果实，再在沸水中把它煮熟，晒干后放在碾子上碾，最后把壳皮杂质簸淨即成。

商品规格：河南产品不分等級，带粉紅色的皮少，以淨白的为好。

鑑別方法：本品为圓球形的种仁，似豌豆大小，色黄白，近屁股的一半呈白色，另一半为黄色，外皮光滑，内部为白色多粉質，味甘。

用 途：滋补强壮藥亦有收斂作用。

包 装：双麻袋。

貯 藏：防潮防霉，过夏易生虫，应放置在硫磺炕室中。

其 他：山东来貨色稍紅，分为：黄实和黄实瓣二种。

別江產的最佳，身干、个大（直徑二分以上）。色白。湘潭貨，籽最大。

狗 脊

別 名：黑狗脊。

產 地：洛陽專區，嵩縣、宜陽、洛寧等地。

產 季：二、三月八、九月均可採之（秋季產品質量好，个大、肥、質堅，春天品質較次）。

產地加工：出土後晒半干（全干時燒毛時易焦）然後用火燒去須毛防止燒焦質量變低。

商品規格：个大肥粗，質堅實，色棕黑，無須毛，須根，不焦無土為佳。

鑑別方法：本品外形略似狗的脊骨（故名），但刺多而有須毛（鱗葉）通體彎曲不直，有很多分枝，外面棕黑色，帶棕色須毛與黑色須根，斷茬黃褐色，有數個白點散，無味，少有腥氣，水浸後腥氣更重。

用 途：壯筋骨，補腰背，適用於老年人腰膝酸痛，行走無力及關節疼痛等。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮，置於乾燥處保存。

其 他：金毛狗脊是另外一種，金毛狗脊，全身帶金黃色毛，此毛能止血，治刀傷，體大而堅，色棕黃。

狗 寶

產 地：河南各地都產，生於狗的膽里。

產 季：無一定季節。

產地加工：是狗的胆結石，杀狗時見有宝取出后晒干即成。

商品規格：不分等級。

鑑別方法：大小不一定，有像拳头和鷄蛋那樣，有圆形，长圆形，外皮灰黑色似石头，質坚硬，里面分层，显灰白顏色。

用 途：治瘋癩。

包 装：紙包。

其 他：馬宝：个大，外皮发白，里面呈灰色亦分层。

騾子宝：大小和顏色与馬宝相似，但它不光滑，有馬蜂窩樣。

卷 柏

別 名：还阳草，万年青。

產 地：主产于嵩县、魯山等县。其他山区都产，生长于山区岩石縫隙中。

產 季：夏秋两季均能采集。

產地加工：采下后，除去其根，阴干即成（阴干色綠）。

商品規格：不分等級，以无土无杂，色綠，中間无根者为佳。

鑑別方法：本品以干燥全草（除去大根）供藥用，是多数条状枝叶（很似柏树叶），向內卷曲而成的拳状物，外形略似佛手，內层枝叶綠色，外层棕黑色。有少数須根。

用 途：和血、止血、破血（生用破血，炒黑用止血）。

包 装：竹篾或席包。

貯 藏：置干燥通风处保存。

芙蓉叶

产地：主产禹县、长葛。其他地方亦产。

产季：秋季七月产。

产地加工：花开后摘下，而后割下秧，摘下叶，捆成把晒干即成，也有不摘叶，全棵晒干的。

商品规格：以青绿色，完整的净叶为好。

鉴别方法：形似麻叶，（心脏形）但没麻叶大，叶为掌状浅裂，叶柄为灰绿色，实心，麻叶杆（柄）空心。

用途：清血热，消肿毒，为疮伤消肿介毒药。

包装：席包（叶）。

贮藏：防潮（发霉变黑）。

九 划

柿 蒂

别名：柿子疙瘩，柿饼蒂（本品为柿饼之蒂，不应该是烘柿之蒂）。

产地：主产滎阳、汜水县、其他专区也产。

产季：八月十五后柿下树，柿蒂在十——十一月间出新。

产品加工：将作柿饼之柿由树上采下（中秋节后），削去

外皮，放薄上晒至半干时，合并堆在一起，闷些时间再摊开日晒，晒后再闷至柿长霜时将霜刷下来再晒再闷。至霜长完（前后需时间两个多月，九~十一月）。当柿饼制成后，柿蒂随柿在加工的时候由于翻动而脱落或在串柿饼时蒂被抛掉。将柿蒂集中整理干净即成。

商品规格：不分等级，其上带柿饼霜为正品，整洁无杂干净的为佳。

鉴别方法：本品为柿饼的蒂，色棕，蒂面带有白霜，一般是飞边或不整齐。烘柿蒂在商品中混有，蒂面带霜，有飞边，较完整，为次品。

用途：平逆，降气，用于呕吐，干哝，治恶噎。

包装：麻袋。

贮藏：防潮湿，淋雨后发黑（霜脱落）。

威 灵 仙

别名：铁脚灵仙。

产地：主产洛阳专区的洛阳、灵宝、信阳专区的信阳，新乡专区的济源、延津，均为野生。

产季：四季都产。

产地加工：挖起后放三、五天，去枝叶，将疙瘩头（地下部分）及须根一起切成饮片（晒干后太硬，即不易切片）即可。也有原个打成捆。

商品规格：不分等级，以片大色白为佳。

鉴别方法：本品为威灵仙的地下部分，现在市场见到的是加工过的饮片，片子厚约半分外皮灰黑色，里边灰白色，质坚硬四周多有突起之须根。并有切断的须根粗约半分，长短不一，

質坚硬不易折断，外皮黑色，无特殊气味。

用 途：驅風，治筋骨痛疼、風濕症。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮。

其 他：商品中有苗子（青色）及根莖（疙瘩頭）的切片混在一起。

独 活

別 名：山独活、大活。

產 地：新乡专区、济源、修武等地产之，野生。

產 季：秋季产之好，本品只用其根入藥不用其苗。

產地加工：采出后将其苗莖切去，晒干即成生藥。

商品規格：不分等級以无土淨的为佳。

鑑別方法：本品为园錐形长的根，約四、五寸，尾部有的有叉，有的独条，皮土灰色，断茬有微紅心，皮有縱抽溝，粗者如大母指，細者如小指，气香味苦。

用 途：①鎮痛鎮痙藥，感冒、头痛、各种神經性痛，并有利尿消腫之功。②疗伏風，去浮腫。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮（干燥保存）。

其 他：山独活、苗子大且硬，沒有肉气，商品中不带叶苗，全是根，气味似樟腦。四川产的商品中带叶苗柔軟有肉气味清香。

柴 胡

產地：洛陽專區的洛寧、欒川、嵩縣、盧氏。新鄉南陽等專區均產，其中以洛寧產之為最佳。

產季：秋冬季產（苗枯後即採挖），春季產者心空。

產地加工：挖出後去苗及蘆頭再用剪子把小根和鬚根剪掉曬干即成。

商品規格：分大、中、小三等。按個的大小（上部的粗細而分），大柴胡粗2~3分；中柴胡粗1~2分；小柴胡1分以下。

以身干肥大，質堅而柔軟，無苗無須根，有粉氣，皮黃黑色，茬白色為最好。

鑑別方法：用柴胡乾燥的根入藥，主根瘦長，作不規則彎曲狀，有葉，有分枝，根頭部有殘莖並有多枯乾葉柄的殘余，外表為暗棕色，其折斷面呈纖維狀，色黃無香氣，味甘。

與紅胡（紅柴胡）區別：紅胡是軟苗，蘆頭上有毛，外皮紅棕色，皮松又少。

用途：退寒熱、疏肝郁，可治瘧疾。肝郁肋痛。

包裝：出口，用木箱（防壓損貨）。

國內銷用席包（130~140斤）。

貯藏：防潮置於乾燥通風處保管。

其他：①紅胡多銷南方，此地銷是很少。

②產黑土地者色黑，出黃土地者褐色質好。

柏 子 仁

別名：柏子、柏麥（均指沒去皮的）。

產地：主产于信陽、南陽、開封、新鄉、許昌等專區。

產季：秋後十月產新。

產地加工：十月間，當果實成熟開始裂開時，以竹杆打之，地上鋪以布單收集果實。涼干後以磨磨去皮，磨時需將磨臍用兩個銅錢墊起，以防磨碎，磨一次，篩一次，反復磨數次，（或者隨時用風車搗去外皮），直到含有七、八成仁即為成品。

商品規格：不分等級，以皮去的淨（種皮）粒充實不泛油，無雜者為佳。一般以八成貨（子仁占80%）即為最佳品，（沒有十成貨的。）

鑒別方法：本品系柏樹的種仁和種子入藥（種仁約占80%），呈長橢圓形，種仁黃白色，一頭尖，一頭圓，油性很大，帶皮的種子為棕紅色。有特殊香氣、含有大量油質。

用途：有安神鎮靜作用治神經衰弱，心跳，驚恐多夢，出汗、又為補藥。

包裝：用雙重麻袋裝。

貯藏：最易生蟲，夏日勤晒（不能暴日晒，防蟲防出油。）

其他：①五斤帶皮制成一斤仁。

②放年久發紅浸油。

故 子

別名：懷故子，破故子。

產地：产于商丘、新鄉兩專區，以博愛主產家種。

產季：三月間種，中秋節前後直到九月成熟，邊熟邊采。

產地加工：成熟後（發黑）用手櫓下，搓下花包，去包晒

干即成。

商品規格：以无土、无杂质为好。

鑑別方法：本品以种子入藥通体呈黑色，种子如腎形，大小似萝卜子，全身带麻点罔紋，有特殊的臭气。

亳州产的儿子：个較小，有帽（残存的花萼）。

用 途：补骨，治腰酸痛。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮。（不生虫）。

其 他：①商丘产的最好。

②儿子有假貨以胡萝卜的子充之。

紅 花

別 名：怀紅花。

產 地：新乡专区的延津、封丘、汲县、原阳、許昌专区的西华、鄆陵（南五村）、扶溝等县。以延津产量最大。

產 季：第一年八、九月种，第二年麦收后采收。

產地加工：到采收期，趁早晨有露水时（此时花苞潮湿不刺手），选已成为橙紅色的花，以手摘取。（刚开时黄色第二天变紅。变紅后应馬上摘，日久即变黑色質次），采后阴干不宜日晒（晒后易变色），开始采收后，每天早晨都要及时去采，过期則花色不好。开花后最怕連雨或阴天，对花要变黑，所以要抓紧时间及时采摘。一般每块地由开始采花到采完約需半个月。每亩平均产量約七至八斤，最高年产可达二十斤。

商品規格：不分等級，以紅色、毛长（毛即是花瓣一筒状花）、油性、白筋少、不霉烂为佳。

鑑別方法：本品藥用为乾燥的花冠，管状长约5—6分

(色橙紅鮮艳发亮。)每一小花中間帶有黃白色花蕊(即所稱白筋)。有油性。陳貨色氣发暗，色深。

用 途：活血、破血、治經閉。為婦科要藥。

包 裝：白布袋裝，過去怕紅花干的不透，有在包內加2~3斤木炭以吸潮，重量除外。

貯 藏：防潮(吃潮後霉爛變黑)防日晒(色變黃)。

其 他：1紅花餅，摘下鮮貨，不干即舖于碾上約2寸厚，轉二、三轉，取下放高粱薄上晒干(不要翻動，免變黑)即成紅花餅。多銷東北及天津。

另有加入面粉的紅花餅是劣品，是在碾壓時趁濕加入十分之一面粉，碾後也成餅，此貨最易生蟲。此種紅花餅，質堅實而硬。不似好紅花餅那樣松軟。

2、過去收購時分為毛貨：有砂土(過去有兌入10%的砂土的)，手握之發涼。淨貨：無砂土。過去又由質量好壞分為三等：

一等：色鮮紅，有油性毛長(5~7分)

二等：色鮮紅，有油性毛稍短(3~4分)

三等：色淡，白筋多，毛更短。

本省產品以許昌專區的鄆陵、扶溝及黃河以北新乡專區的武陟、延津、封丘等縣產品為佳。

懷紅花(新乡專區前懷慶府)產品最好，多是淨貨，色橙紅，毛較長。白筋大為其特點。

四川、甘肅、雲南產紅花毛短，色氣淡黃，質量較次。

浙江省品名“杜紅花”，色紅，毛長，白筋少質量好，但產量很小。

紅 娘 子

別 名：紅娘。

產 地：主产于信阳专区的息县、光山、潢川各县。

產 季：七、八月。

產地加工：紅娘是野生豆地中的昆虫，多棲息于豆秧上。在采取期間，早晨趁日出以前，昆虫翅上露水未干不能飞起时，以手捕捉。捉后放鍋中，微微煮沸，取出晒干即成，捕捉后注意洗手，以防中毒。

商品規格：不分等級，以完整不碎的淨貨为好。

鑑別方法：紅娘是帶翅昆虫，腹背皆为紅色，头黑色紅咀，翅黑褐色有花边，形状很似秋蝉（俗称馬儿鳥）但体小，体长约有6—7分，体外有油脂性，有毒。

用 途：多与斑蝥共用，作外用藥治疮癬，能及使皮肤发泡。

包 装：装紙盒或鉄筒，防压不使破碎。

貯 藏：夏日易生虫，要勤晒，量多时可放硫黄炕房中。

紅 腰 子

別 名：紅腰子。

產 地：主产于嵩县、卢氏，野生。

產 季：冬季。

產地加工：挖出后去苗秧，用火燎去須毛及須根，然后用刀切成厚片，晒干即成。

商品規格：不分等級，以身干色紅的为佳。

鑑別方法：本品是不規則形的根所切成的厚片，薄厚不一，切片也不同，外皮棕黑色，帶有火燎痕，斷茬紅黃色，質堅硬，帶有很多疙瘩，及未燎淨小根，見水后有紅色溶出。

用 途：多用為食品及木製品染料。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮，干燥保存。

苦 杏 仁

產 地：主產商丘專區，其他專區也都產。

產 季：麥黃時及麥后產新，（秋后杏仁上市。）

產地加工：取杏核平鋪于石板或磚地上，圍上指頭粗的繩子（繩粗細應于杏仁厚薄相同，防止仁破），用石頭或其他器具榨碎杏核（杏仁不破），取出杏仁，整理干淨晒干即成（不能洗，洗后脫皮）。

商品規格：不分等級，以片大不霉，不破頭，不癟為好品。另有碎杏仁，即破亂的，可作食用。

鑑別方法：本品為山杏（仁苦）成熟的種仁形似倒心臟形，種皮薄紅黃或棕色，邊緣厚（與桃仁區別），味苦（與甜杏仁之區別）。

“甜杏仁”體較扁而大，故又名“甜大扁”，味不苦，俗稱“叭胆杏”。

用 途：滋潤之功能利肺氣，治外感咳嗽喘滿，又能下氣，可治腹中腸鳴及大便秘結。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防止潮濕，防蟲，防霉。

苦 丁 香

別 名：甜瓜疔瘡（野生為正品）

產 地：各地都產，主要集散地——鄭州。

產 季：六、七月產。

產地加工：甜瓜熟後，將把連瓜一起割下，再把瓜蒂摘下陰干即成，但瓜熟時其把苦味減少而效力小，故以未熟瓜入藥，在采瓜的同時將瓜把子摘下來，陰干入藥（若等瓜把拔秧時再摘瓜把，則已枯干無效力）。

商品規格：干淨、無雜，把短的為好。

鑑別方法：本品為淡黃棕色或土黃色，約一寸的纖維性瓜蒂，在把的頂端，有放射狀的疔瘡，味苦。

假劣品：甜瓜秧剪斷，無疔瘡。

黃瓜蒂個小干後沒有疔瘡。

用 途：有效的催吐劑，由於齒傷、霍亂、吐熱疾，疔黃疸，治風癰，咳逆上氣。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防潮、發霉、發黑。

苦 棟 子

別 名：棟子。

產 地：河南各地都產，新鄉專區產的多。

產 季：數九天以後產新。

產地加工：霜打後果實變質，經九天后才能全干，干後打落即成。

商品規格：不分等級，以色黃個大，肉厚的為好。

鑑別方法：本品是棟树的果实入藥橢圓形，未熟时黃綠色，熟后黃白色，外形很似大个的酸枣，带棕紅色麻点，干后果皮离肉，果肉淡褐色，味酸，微苦。

川棟子：个大，直徑約6—7分，金黃色似金桔。

用 途：杀虫止痛，主要用于蛔虫虫积，热厥胃痛小腸疝痛肋痛、腹痛、胃热煩燥、胸腰不暢等症。

包 装：竹篾。

貯 藏：防潮貯存，見潮变黑。

其 他：棟树分为两种；一种是苦棟树，果实瘦小，无肉气，一层皮。另一种称为棟树，果实肥大有肉气，入藥用的苦棟子，多是棟树的果实。

苦 棟 皮

別 名：棟树根皮。

產 地：河南各地都产，新乡专区产的多。

產 季：春季。

產地加工：把树砍倒后，挖出根，刮下外面的紅皮，晒干即成。

商品規格：不分等級，以身干色白皮厚不发霉的为好。

鑑別方法：本品是苦棟树的根皮与树皮入藥皮呈金黃白色，易折断，断茬有白色的絲样毛状粉，味苦。

用 途：腸寄生虫，驅虫藥，对縲虫，蛔虫，蛲虫有效。外用治疥癬，并有泻热治疝痛，杀三虫。

包 装：打大捆。

貯 藏：防潮。

苦 参

產地：嵩县、伊阳及大别山区，新乡专区亦产，野生。

產季：秋季九月間出新。

產地加工：挖出后，把苗茎去掉，趁濕用竹刀把皮削去，或切成橫片（厚約2—3分）晒干即成。（濕切品干后吸心呈凹形，干切的是一样平）。目前也有不切片的，多折成兩半。

商品規格：不分等級，以片大，薄（1分以下），粉氣足，質干，斷茬黃白色的為好。

鑑別方法：本品的根入藥，通體為圓柱形，常有分叉，有莖部殘莖及少數枝條，皮呈黃白色。折斷面不平坦，黃白色，呈纖維性，味極苦，

用途：利尿、健胃、驅蟲、腸出血，又作農業殺蟲藥

包裝：席包。

貯藏：防潮，防霉。

其他：嵩縣產品是長條，皮呈黃白色，新鄉產品是切成橫片（2—3分厚）木質中間有菊花心，絲很細外面有一圈，中心凹入，色黃白帶灰；洛陽是折成兩半成條狀。

香 儒

產地：禹縣、長葛均系家種。

產季：麥收后。

產地加工：割下后，除去根部，打成捆晒干即成。

商品規格：以帶穗的，色發黃，味香的為佳。

鑑別方法：全草供藥用，莖高1—2尺，莖方形發白，細而脆，很少分叉，葉對生，卵圓形或橢圓形莖葉都有特異香味。

用 途：发汗利尿、介热消肿、治霍乱、腹痛吐下散水肿去嗅。

包 装：打成大捆后用席包。

貯 藏：防雨淋，发霉后变黑。

香 櫟

別 名：鉄篱寨。

產 地：主产于商丘专区，其他各专区也都有产，多生于山地，菜园边，或宅边。

產 季：霜降后产新（八、九月）。

產地加工：树高4至5尺，茎枝有綠色长刺，叶似桔叶，香櫟（果实）未熟时青色，成熟后变为黄色，熟后摘下果实晒干即成。有的熟后自然脱落，拾起晒干也成。

商品規格：不分等級，以黄色，身干，个大，饱满的为好，色青黑干癟破裂为次。

鑑別方法：本品是园球形，干燥的果实，外皮黄褐色，有皱縮的麻紋很似小个的桔子，質坚硬有香气。破开后內包多数黄白色种子，不分瓣，种子似瓜子仁略小，多包很薄的黄色薄皮。

青皮个（整个的）与香櫟大小相似，但青皮的外皮有疙瘩黑綠色白茬，質輕香气浓，內部子少，破后香气更浓，并有很多油溢出。

用 途：治疝气，下气，消痰水，咳嗽，心气痛。

包 装：麻袋，布袋。

貯 存：干燥处放置。

其 他：①川香櫟，个大，长约2至3寸，长圆形，肉厚。香气浓，味长，現在調来我省的川香櫟是为片子，外

形略似佛手片，

②树高4—5尺，茎枝有綠色长刺，叶似桔叶，香櫞（果实）未熟时青色。

香 附

別 名：莎草疙瘩，莎草根。

產 地：主产开封专区中牟（产品质量最好）、許昌专区舞阳、商水、西华也产，其他各地都产。

產 季：秋后（收谷子后）收。

產地加工：出土后，晒半干，用小火烧去毛，再放于蒸籠中。蒸一小时左右（这样便于晒干）再晒至半干，放于碾上用碾压之，此时可同时将麦秸砂子与香附共拌一起碾压这样相互磨擦其毛可去，而后过籬除去麦秸及砂土即为成品。

商品規格：个体饱满質堅沒有黑色深溝为佳。商品分毛貨与淨貨。

淨貨——用火燎去毛再上碾，碾压将毛除去。

毛貨——即未經处理的香附子（只燎去毛未上碾）

鑑別方法：香附以干燥的根茎入藥，体呈紡錘形或园柱形，形似枣核，长约四分到一寸，粗約一分到三分，外表紫棕色，有时呈焦黑色，通常有6—10数个。少有突起的环节，在环节上生有众多的棕色长毛須，根基有残留下的根痕，質地堅实，干后更硬，断面顆粒性色淡紅，有明显的环中心的顏色較外层深，气芳香，味苦而帶辛。

用 途：为芳香健胃剂，用于神經性胃痛，食欲减退，胸悶呕吐，腹痛下痢，并有通經作用。

包 裝：麻袋。

貯藏：防潮。

其他：色泽上有白香附与黑香附之分，但收購上不作区别：

白香附——茎基部（近土处）黄色

黄香附——茎基部（近土处）紫色

急 性 子

别名：小桃紅、指甲草子、凤仙花子。

产地：河南各地都产，家种。

产季：秋季八、九月产新。

产地加工：果实近熟时采下（熟后自裂，种子散开）晒干搓下籽，簸去杂质即成。

商品规格：不分等级，以无土的新货（色黄红）为佳，陈货发黑，质次。

鉴别方法：本品是凤仙草的种子入药，呈红棕色扁圆形，形很似萝卜子，但比萝卜子稍小，外部有灰褐色小麻点，质坚硬。

急性子色深棕色，个稍小。咬破后种仁灰白色，皮与仁不易分离。

用途：破血、通经。

包装：麻袋。

贮藏：防潮。

其他：与萝卜子（莱菔子）的区别：萝卜子个稍大，色淡发红微扁咬破后鲜黄色，皮薄与仁分离。

虻 虫

别名：牛虻。

產地：南阳专区，信阳专区。其他地区亦产。

產季：夏秋間。

產地加工：用鞋帮，蝇拍扑打，捕捉后晒干即成。

商品規格：以黄綠色，体全，不掉头眼者佳。

鑑別方法：体呈长椭圆形，长7~8分色灰，头部闊，眼黑綠，触角大，色黄，口吻粗，如肉質，有数条刚毛，胸背有灰白色条紋五条，腹部长大，呈黑褐，中央有粗大之直紋，翅透明。

用途：逐淤血，破血积，坚癥，症瘕，月水不通，积聚，淤血在胸腹，破坚化积，攻瘀祛痞，一般应用于破血，化痰。（无淤者禁忌）

包裝：木箱。

貯藏：易生虫，过夏时应硫黄薰之干燥处保存。

洋金花

別名：胡茄花，喇叭花。蔓陀罗花。

產地：河南各地都产。

產季：七、八月采收。

產地加工：花初开后采下花，捆成小把或以綫連成串晒干即可。

商品規格：不分等級，以黄白色完整的大花为好，散貨色气变淡或发黑者次。

鑑別方法：本品是大形的长喇叭花，长可达4—5寸，鮮时白色，干后黄白色，喇叭口处呈五角形内包黄白花心五个（小蕊）下部有黄綠色花托（萼）包于花筒之外，长可达全花长之半。

用途：鎮咳，吸食后治气喘。
包裝：席包。
貯藏：防潮（見潮色变白，或发黑）

禹 粮 石

產地：禹县。
產季：四季均产。
產地加工：挖出后即成。

商品規格：不分等級，色正易捏碎成粉則佳，沒有成熟的則不易打碎。荏同青石样即为次貨。

鑑別方法：本品是矿石，呈土黄色的土块，質坚硬，但有粉性，易打碎，打碎后即成細的粉末。断面易显土黄色（較紅一些）。

用途：补虛、止崩漏、止血。
貯藏：防雨淋，防日晒。

扁 豆

別名：白扁豆、白梅豆、白豆。

產地：主产商丘专区、开封专区；开封、武陟、原阳等地也产。

產季：春种一秋收（八、九月）。

產地加工：摘下角果剝去皮，晒干即得。

商品規格：不分等級，无土不生霉，身干，肥胖，青白色为好，黑色則次。

鑑別方法：本品为白扁豆的种子，类扁圆形或腎形，青白色，种臍上带一突起的白条（种阜），除去外皮种仁白色分两

瓣，有豆性气。

用 途：健脾，去濕，治白赤帶下，用于食物中毒性的急霍乱吐泻，解酒毒，治醉后呕吐。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮（不易生虫）。

其 他：扁豆皮，称“豆皮”也入藥。

扁豆花，称“豆花”也入藥。

扁 豆 花

別 名：梅豆花。

產 地：河南各地均产，商丘专区为主要产区。

產 季：中秋节前后采集。

產地加工：此花开后自落，扫集收起晒干拣净即成生藥。

商品規格：不分等級，整朵，身干洁净，不生霉为佳。

鑑別方法：本品即是白扁豆花，白花入藥（紫花不入藥）。

花干后呈土黄色，花瓣色淡，花筒近淡棕色并有很細的花絲。

用 途：止滯、利水。

包 装：席包。

貯 存：防潮，受潮发霉变黄。

其 他：炒好研成粉末与柿餅吃，治痔疮。

十 划

桔 梗

產地：主产于南阳专区的桐柏、泌阳、洛阳专区的卢氏、洛宁县，以南阳专区的桐柏县产品最好，其他地区也有生产。

產 季：春秋二季，秋季产品質坚实为佳品。春季产質虛空心为次品。

產地加工：鮮貨挖起后，去苗，放一日后使稍軟，用竹刀（或竹签）刮去外皮，曝日晒干（如經水洗和干后发黃）即可。

商品規格：以色白，質堅，无粗皮者佳，其規格分为：
一等：銀牙桔梗；（产于桐柏县）。色白，皮細，質堅，不空心，（俗称无眼鏡圈），蘆头細短，抽溝淺，为其特点。
二等：个大，色白，折断后有眼鏡圈（皮心不全相連）。
三等：个小，色黃白，折断后有眼鏡圈（皮心不全相連）。

鑑別方法：本品是圓錐形的根，上帶蘆头（根茎）有明显的蘆碗，下部有的有分叉，通体有順紋与抽溝，外皮黃白色，断茬不平，白色有黃圈，味微苦，无香气。

与沙参的区别：沙参体泡个大。外部有明显的棕色环纹，断面无硬心质疏松，茎头细小，头粗尾细，味甜不苦。

用途：散寒止咳，祛痰，排脓。

包装：桐柏产“银牙桔梗”用竹篾装。洛宁（王范）产品用席包。

贮藏：防潮、防虫。不碰破皮，不易生虫，受潮后发霉变黑。

桃 仁

别名：山桃仁（洛阳专区）

产地：主产洛阳，新乡及开封专区等地。

产季：夏秋两季。

产地加工：用石击碎桃核，取出桃仁，与杏仁加工方法相同。

商品规格：不分等级，通常以片大，棕红色不破头者为佳。有时也以大小不同分为两种。家种为大桃仁，野生为小桃仁。

鉴别方法：本品为桃子的种仁外观棕色扁长圆形，通体扁平，边薄，皮细，皱纹少，较杏仁皮松，味微苦。

用途：破瘀血，妇科药。

包装：麻袋包装（150~170斤袋装）

贮藏：防潮湿防止生霉。

其他：①入药时应煮后去皮尖。

②秋季出新为好，秋桃核仁饱满，伏桃（夏季五月间）无核仁。

馬兜鈴

產地：主产于洛阳专区嵩县，南阳专区的内乡西峡，新专也产，野生。

產季：秋后八、九月产新。

產地加工：秋后待其熟乾时（不熟时体重没人采），摘下晒干即成。

商品規格：以个完整，外青里白、不霉烂者为好。

鑑別方法：本品是圓球形果实，形似鈴（故名）一头尖，一头圓。熟时由把（果柄）裂开，把分六条細絲，果分六瓣。每瓣中含多数扁三角种子。

用途：止咳、平喘（用量大时，有呕吐現象）可治咳嗽，水肿，腹大，喘息等。

包裝：席包（包装时打些水，防压碎）。

貯藏：防潮、防霉（变黑）。

其他：其秧名“天仙藤”，其根名“土青木香”均入藥。

西峡产一种“馬兜鈴”，形长两头都是圓的，中間稍細（长度約有2寸左右）是另外一种。

荊芥

別名：藥荊芥。

產地：許昌专区长葛、禹县主产。新乡及商丘两专区也产。

產季：春秋两季。

產地加工：成熟变黄时割下，晾干，切去根部即老茎約切2—3寸长的茎即成。

商品規格：不分等級，以穗多色綠紫，杆无根，香气浓，不生霉者佳。

鑒別方法：本品以荆芥的地上部份入藥，杆呈方形，色紫或淡紫色有香气，味发凉，上帶多数穗，荆芥穗呈谷穗状，穗上生有黑棕色种子，似車前子，杆上叶很少。

新乡专区产荆芥（野荆芥）杆粗，呈淡紫色，分枝稀，枝与杆角度大，穗呈淡黄色大而少，味小而有青蒿的恶味。

用 途：芥穗清肺热，荆芥清内热、解表、除濕、适用于伤风、感冒、发热头痛、身疼、咳嗽等并治血热疮伤、痘疹等症，炒黑后止血用。

包 装：席包。

貯 藏：防潮，見雨后发霉，失效。

其 他：春种品（春荆芥，早荆芥）三月种，长得深（高）約2尺以上，穗少質次，紫干发白，空心，秋后（8月）收。秋产品（晚荆芥）在麦后种，穗多短（一尺左右）質好，紫干，8月收，均系家种。

茯 苓

產 地：主产于信阳专区的商城、新县、固始、潢川各县。多是人工种植的。

產 季：春三月下种、秋天产新。

產地加工：春季选指头粗細的松根 削去外皮，露出新木茬，粘上新茯苓浆液埋于地下，即能生长。当年或第二年秋季在下种处之四周挖取，即可得茯苓。挖出后用茯苓刀削去外皮

(为苓皮),再剥去赤色的内层(赤苓),然后再根据茯苓个的大小及适合于某种规格材料,切成刨片、神方、苓心等不同规格。切好后以木板压好阴干即成。天字片及刨片在装箱前再用剪刀剪齐。

商品规格: 茯苓的规格很多,现依其加工方法不同可分为以下几种规格:

(1) 苓个: 是未经加工的整个茯苓。以皮细、无砂、质重不裂口为佳。质泡、裂口、带泥沙的为次品;

(2) 刨片: 是最好的规格(一等货)、是方形的薄片、比铜钱还薄、片薄、色白、有骨气、带有云彩(对光看之呈现灰色花纹),四边整齐不破碎。多装木盒。

(3) 天字片: 质量仅次于刨片(二等货)色白、片大而薄(约半分厚),也带有云彩。

(4) 地字片: 多是切天字片、神方、或刨片打下和剪下的碎片是大小不正的不定形状的碎片。

(5) 神方: 是带神木(茯苓当中的松木)的正方形厚片(约2分),好品应当是带有褐色神木、质坚、色白的厚片。

(6) 白方: 是不带神木的正方形厚片。

(7) 苓心: 似骰子大小的小方块。是切大片剩下的碎块再切的小骰子块,所以赤白色均有。

(8) 赤苓: 削去后,再削下赤色部分而得,是破碎不整的碎块,有白色、棕色、赤色,有的还有苓皮在内。

(9) 苓皮: 是削下的外皮,多为棕黑色,内面为灰色,有松树皮及泥砂等夹于其中。

鉴别方法: 真假神方的鉴别: 伪品是在切方前插入一圆形鸡血藤(因颜色相似,易切);而后切方而成。本品中间神木(鸡血藤)圆形,有圆纹、多凸出于神方表面,四周没有赤褐

色阴边。真品神木，多不在正中，木不光滑，四周有赤褐色阴边，颜色较深，边缘不整齐。

过去有用糯米面做成馍，而后切成天字片、地字片等充伪品。此货色气黄白，无云采，体泡易碎，牙咬后发粘。现已没有。

用 途：茯苓：健脾、除湿、清痰；

茯神：安神；

赤苓：利水；

苓皮：治腹肿；

包 装：刨片装木盒（10斤上下）内襯血料纸，天字片、地字片等都装木箱（100斤上下）。苓皮、用席包。

貯 藏：防潮，吃潮后长霉。

豹 骨

產 地：主产在新乡专区的太行山区，洛阳专区，南阳专区的伏牛山区。

產 季：四季都产，春冬二季产量较多。

產地加工：冬季用毒饵，春夏秋多用猎枪捉捕，将捉的豹子剥去皮肉，取少带筋肉的骨骼即可出售。

商品规格：不分等级，以无筋肉的净货为好，入药用以腿骨最好，肋骨腰脊骨稍差，头骨为最次，另有豹脰多取出另外出售。不在全架豹骨之内。如是全架豹骨，应首先以其四条腿骨为主，其他如其有无头尾等关系不大。

鑑別方法：豹骨色黄白，外皮稍带干枯的筋肉将各部分连起，略带油性，有微臭，真正的豹骨有以下几点特征：

①头骨：上部园形，口部略尖，虎头骨上部园形，口部較寬

②肋骨：园形，其他动物多是扁的，虎肋骨也是园形但比豹骨粗大。

③腿骨：豹腿骨与虎腿骨相似，前腿上节的下端有一园形小孔，后腿上节下端内側有一三角形的孔。前后腿下截均是由二股組成。豹骨細小，質輕，油性少，虎骨長大，質重油性大，色发黄。

④尾骨：豹尾骨最长，大者可达3—4尺，有27节，其他兽类的尾骨較短。虎尾只有18节。

⑤脛骨：豹脛，骨略似虎脛骨，正面园形，内面扁平，豹脛呈长园形較小，长约一寸，寬約八分，虎脛园形較大。

⑥一般豹骨在十斤以下。

另有死豹骨，是死于深山中多年的枯骨，質輕不堅，沒有油性，为次品。

用 途：治風濕，壯筋骨，攀急屈伸不得走，注疼痛，代虎骨入藥。

包 装：麻袋或装箱。

貯 藏：放于木箱中保存。

其 他：过夏才可使骨肉分开。

海 桐 皮 及 丁 皮

產 地：主产在南阳专区。

產 季：冬春两季，冬季产量多。

產地加工：将树砍倒后，剥下皮晒干，分为丁皮，海桐皮即成。上部带丁的为丁皮，下部无丁的为海桐皮。

商品規格：不分等級，以不发霉，内表面白色为好。

鑑別方法：丁皮为棕黑色的栓皮，在皮上长有不規則的大

小不等的純形刺針，形如泡丁(其他的樹无泡丁)，其內表面白色为佳。

海桐皮比丁皮厚些，其上面无丁，或偶有丁的痕迹上部栓皮厚，皮較粗糙，味不苦(秦皮味苦，皮薄纖維性强)。

用 途：①主治霍乱赤白痢，并用于風濕，痹痛，脚气，腰膝痛有收斂鎮痛之功效，外用治疥癬及痛。

②祛風濕，利經絡，霍乱，赤白久痢。

包 装：打大捆。

貯 藏：防潮(防发霉)

其 他：习惯認為上丁，下海，樹的上部为丁皮，下部为海桐皮。

秦 皮

產 地：主产嵩县，伊阳等地，南阳，內乡也产。

產 季：春季产。

產地加工：采集时先将樹砍倒再将皮剥下，晒干即成。

商品規格：不分等級，以身干，淨貨为佳。

鑑別方法：本品为秦樹之皮入藥，外皮灰白色，上面有紅色的小点(皮孔)里面呈黃白色，不易折断，断面纖維性强可以被一层的削下，不发粘，味微苦，无香气。

用 途：苦味健胃收斂剂，用治腸炎下痢，有消炎介热，收斂止泻之效，外用治眼疾。

包 装：席包，或打成大捆。

貯 藏：防雨吸潮后发黑。

桑 叶

別 名：霜桑叶，白桑叶。

產地：主产商丘，許昌两专区，其他各地都产。

產季：下霜以后采集，以不結桑椹的桑叶（称白桑叶）入藥。

產地加工：霜后叶自行落下，扫起去淨土杂晒干即成。

商品規格：以叶大、体完整不碎，顏色发黄的为好。不經過霜打的叶，呈青綠色。

鑑別方法：叶呈心脏形，边缘有鋸齿，上表面光滑，體質柔軟，經霜打过的，叶为黄色。

用途：辛凉介表藥，适用于风热头疼，惡寒发热，咳嗽，无汗，目赤眩喉痛。

包裝：竹篾，打包时，在早晚趁濕打（因为不能噴水，見水后就变色）这样就不易碎。

貯藏：防潮，吸湿后多黑。

桑 白 皮

別名：桑根白皮。

產地：商丘专区为主产。其他各地亦产。

產季：冬天。

產地加工：挖出根后把外面的一层黄皮刮去，再用刀划成二尺左右的长筒，剝成一块一块的皮块，晒干后即成。

商品規格：身干、色白、粉气足、块整、皮厚者佳。

鑑別方法：本品为桑树的根部內皮其长数尺，外有紅黄色的薄皮，残留順茬色白，不易折断，其皮是細絲組成，薄厚不等，厚者达2~3分，薄者如紙。

用途：泻肺平喘清热祛痰等功用适用于：

①支气管炎。肋膜炎。痰飲。咳久水肿及喉中有水鷄声等

症。

②关节疼痛及脚气病。

包 装：席包。

貯 藏：防潮、防霉、置干燥处保存、受潮后发霉长毛。

桑 寄 生

别 名：寄生。

产 地：产于嵩县，卢氏，欒川，洛宁，宜阳等地。

产 季：四季均产，3—7月产得最好。

产地加工：采集后晒干即成。

商品规格：不分等级，在桑树上生的最好，有少数的生在柳、楊、榆树上，但采下之后则不易区别。

鉴别方法：本品为寄生的灌木，是黄色的枝条。分支很多，并有很粗的节，体轻易折断，断面有菊花心，外皮有皱纹，柔软韧性大。

用 途：强壮剂，并有消肿及催乳作用，并可治腰痛。

包 装：席包。

貯 藏：置干燥处，防止生霉变质。

其 他：本省所产多为楊、榆树上生的。

桑 枝

产 地：河南各地都产。

产 季：冬季，立冬后采集。

产地加工：立冬后将本年新生的嫩枝割下，晒干即成。

商品規格：不分等級，以粗細如筆杆狀的獨條為好，隔年的老枝不入藥。

鑑別方法：本品是桑樹上當年生的枝條，多為桑櫟的枝條，是不分叉的獨條，灰黃色，條長2—3尺，粗約1—2分，條上無葉有芽，質柔韌易折斷，斷茬白色。

用 途：通經絡，止筋骨痛。

包 裝：打捆。

貯 藏：防雨貯存。

茜 草

別 名：沙茜秧根。

產 地：河南各地都產，野生。

產 季：四季都產，冬季產的最好。

產地加工：挖出後去苗秧及蘆頭鬚根。曬干即成。

商品規格：以蘆頭小（生長年久的蘆頭很大）。色紅，無土，個大，條長的為好。茜草王：根頭粗，在3分以上的。長約5寸以上，大條單枝，小茜草：根頭粗在1分以上。

一般規格分大中小三種：大如鋼筆，中如筷子，小如粗蚊香。

鑑別方法：本品是彎曲的長條根入藥，外皮為紫黑色。易脫落，質堅易斷，折斷面黃紅色，有黃白色環圈，味苦。

用 途：工業用作染色。治血分百病，痔瘻，傷跌折骨，節風痛，淤血，行血。

包 裝：收購時打成捆，出口裝箱（防碎）50—60斤。

貯 藏：易貯存，防潮。

其 他：洛陽專區，嵩縣產品最佳，個大獨條，生長年久者好。

狼 毒

產地：主产洛阳专区嵩县，卢氏等县。野生。

產季：冬季产。

產地加工：挖出，去苗后趁濕切片（多切成二分厚的橫片）晒干即成。

商品規格：不分等級，以色白，粉气足，筋少的为好。

鑑別方法：整个的形似萝卜，商品帶有蘆头。黃白色，断茬呈白色有黃色的花紋，片子質泡易碎，表面亦現有黃色的花紋（各种花紋都有）。皮杏黃色，抽皺，質輕，断面色白，粉气足，帶黃筋味甜（有毒）。

用途：外用治疥疮，惡疮。

包裝：席包、麻袋。

貯藏：防潮。（見潮即生虫，生虫后变苏成面。）

射 干

別名：寸干，老鴉扇，偏竹棵。

產地：信阳专区，南阳泌阳县产之最多，洛阳专区也产。

產季：每年冬春季出产，冬产者較春产者好。

產地加工：出土后用水洗淨，晾干，用火燒去其毛即成。

商品規格：以个肥，質堅，色黃，无色无土为佳。（洛阳专区产的茬白。）

鑑別方法：本品是射干的地下部份，供藥用通体为不規則的凸凹不平的長扁柱体，形似高良姜，很多須根丛生，質結实

而坚硬，不易折断外皮有不整齐的皺紋，呈土黃色，內心黃色，沒有香味。

用 途：治咽喉痛腫，牙痛，咽下氣阻，胸滿，咳逆上氣，喉痹聲閉。痰壅上逆等。

包 裝：竹篾。

貯 藏：干燥保存。

其 他：①其色灰白茬也灰白，質堅品劣。

②与重樓，蒼朮之別：

蒼朮—有香味且較圓。

重樓—紫紅色形圓似蛹，沒有刺，皮松，断面不齊沒有味。

草 烏

別 名：萬年青（沁陽）烏藥（南召），小烏頭（西峽）。

產 地：信陽、南陽二專區產。

產 季：秋後，春天採的中空切不成片，質量低。

產地加工：挖出後去掉殘莖及須根，晒干即為成品。

商品規格：身千個大，去蘆頭，不生蟲的為佳。

鑑別方法：本品以草烏地下部份入藥呈圓錐形，皮松有皺折，下部漸漸細小而尖彎曲，表面黑褐色，內部灰白色。有麻舌性。

用 途：除風濕，用作麻醉與鎮痙，鎮痛藥。

包 裝：席包。

貯 藏：防蟲蛀，防潮。

其 他：烏頭—頸細尖而長。

草烏一頭粗而圓。據說中毒可吃尿泥解之。

党 参

別名：潞党，北党。

產地：新乡专区，产量多。

產季：霜降前后，产新5—7年出的最好（有二年出的，心硬皮軟，沒潤气）。

產地加工：挖出土后，去茎叶，根入藥，用水洗淨，炕干即可。

商品規格：以条粗大，色白为佳。

鑑別方法：本品藥用其根茎，呈园柱形順长条，外部黄白色，肩部有横紋，頂端有較多残茎脫落的痕迹，下部有縱紋，有分歧的側根，断面黄白色，有黄心。

用途：滋补强壮藥，适用于慢性貧血，萎黄病，中气虛弱有效。

包裝：席包，出口的用木箱。

貯藏：防潮，夏季最易生虫，芒种以后进行火炕，以防虫蛀。

其他：捆成韭菜把，每把8—9两重，解放前捆牛角把，长2市尺，外用紅土染之，捆时外条粗大，內条細小而碎，多数內条发霉，有紅土疙瘩，杂草，解放后改为韭菜把，白条，本色，內外一样。

烏 梅

產地：信阳专区各县均产。

產 季：春季三月間。

產地加工：將半黃青梅子采下后，在地上挖成許多坑，在坑內燒稻壳柴草濕烟，每個坑上面蓋上竹架子，將青梅子放在上面熏黑，再晒，晒后又熏，熏后再晒制成為止。

商品規格：色黑光澤，肉厚，飛邊寬味酸，性糯者為佳。

鑑別方法：本品為扁圓形果實，皮黑柔軟有許多皺稜肉厚、味酸。

用 途：生津消熱，止咳的功效，適用於久咳、燥咳等症，有瀉腸止痢，止血的作用，用於大便下血，小便尿血，婦女崩漏下血及下痢，滑瀉不止等症。

包 裝：麻袋。

貯 藏：易霉壞，應避濕貯存。

夏 枯 草

產 地：南陽信陽二專區。

產 季：立夏后收。

產地加工：當在半枯時將果穗摘下，剪去果柄，晒干即為成品。

商品規格：以身干穗長，把短，色棕紅為佳。

鑑別方法：夏枯草入藥部分是開花后的果穗，初夏時開紫色花，花謝后成為棕色，長圓柱形果穗，干后的果穗象麥穗形，全長約1~2寸左右，粗3分多，沒有花朵，呈淡棕褐色，表面附着細的白毛，質輕而脆。

用 途：①治療瘰癧鼠瘡，解內熱散結氣，可用於淋巴腺類及淋巴腺結核等症。

②眼科用治目珠痛，至夜間痛的更甚者用之。以

其能补肝血兼暖肝。

包 装：席包。

貯 藏：防潮，防虫，干燥保存。

茺 蔚 子

別 名：益母草籽，充玉子。

產 地：各地都产，产量多，主要是新乡专区，野生。

產 季：秋季。

產地加工：秋后籽成熟后，割下秧晒干，然后打下籽即成。

商品规格：不分等级，身干饱满，灰褐色，无霉无土为净货。

鑑別方法：为棕黑色，楔形，有三稜的坚尖果，大如芝麻，内含一粒富油质的种子。

用 途：利尿及疗目疾。

包 装：麻袋。

貯 藏：防雨淋。

茵 陈

別 名：白蒿。

產 地：郑州主产，其他地区亦都产。

產 季：2—3月。

產地加工：采其全草，由根部割下，晒干即成。

商品规格：以棵小、叶软嫩的为佳，以无土身干无硬枝为好。

鑑別方法：为嫩的全草不带根，叶弯曲，长约寸许，呈灰白色，有毛茸。黄花茵陈有的带黄花。

用 途：发汗、解热、并能治疗黄疸病。

包 裝： 席包。
貯 藏： 防潮存放，受潮易生霉。
其 他： 长成后多开黄花，此时有梗采下晒干为黄花茵陈。

浮 萍 草

別 名： 水浮子，水上漂，无根草。

產 地： 河南各地均产（有水池塘地方）。

產 季： 夏季六、七月間。

產地加工： 本品生在水池塘中，从水中取出后除去杂草，清水洗净，晒干即可。

商品规格： 不分等级，一般說有大片小片之分，以片大色綠身干，淨貨为好。以色青三瓣之浮萍，为藥用之浮萍其他紫色呈三角形的不可用。

鑑別方法： 本品为类圆形青綠色的叶子，其下部有数条細根为白色，干燥之后成污綠色，半徑約有1分左右，状似芋錢，但无柄无子有腥臭。

用 途： 发汗，利尿。

包 裝： 麻袋。

貯 藏： 干燥保存。放久色变黑。

益 母 草

別 名： 坤草，茺蔚。

產 地： 河南各地均产，野生。

產 季： 夏季未开花时，采集为佳。

產地加工： 夏季未开花时，割下晒干即成。

商品規格：不分等級，以帶花，葉黃綠色者為佳。粗老無花者，為次。

鑑別方法：本品莖方形，長條多枝，高四、五尺葉長形有分叉，夏天開紫小花，環生于莖上部。

用 途：婦科要藥，生新血去瘀血。產後子宮出血，及子宮復舊不全。

包 裝：捆成大捆。

貯 藏：防潮（發霉發黑）防日晒（曬則變白）。

其 他：益母草子，名茺蔚子，色灰黑呈三角形也入藥。貯存時防潮（發霉變黑）防日晒（變白）。另有一種植物，葉苗與益母草完全一樣，莖長較矮，惟花白色，與此不同，不入藥用（俗稱風箏草）。

透 骨 草

別 名：來馬回（洛陽專區）。

產 地：河南各地均產，路邊，地坎，墳地都有，野生。

產 季：秋季7—8月，春季也產，產品較嫩。

產地加工：連根刨起，去淨根部泥土，曬干全棵即成。

商品規格：不分等級，以青綠色。苗葉多，根不很老的為好。根不宜過大過粗。

鑑別方法：本品是帶根、苗的全植物。根長約4、5寸到尺許，根皮粗糙，外面棕黃色，通體有許多麻點，根皮里面紫色，水浸後可將中間木質心染紅（指切片時）。根上叢生多數枝條，灰綠色長約尺許，帶有互生小葉及灰綠色三球形果實，大小似花椒。

用 途：除風，和血，治筋骨痛，外用活血。

包 装: 席包。

貯 藏: 防潮，吃潮后变黑，不能入藥。

馬 勃

別 名: 忽雷炮，灰包。

產 地: 洛陽专区嵩县，其他地区也产。

產 季: 夏秋两季产新。

產地加工: 待其成熟时，采取晒干。

商品規格: 以身干个大体輕发軟，內外皆显金黄色，无杂质不破者为佳。

鑑別方法: 外形为园球，大小不一，大的直徑长約有7~8寸长，小的有2~3寸，皮呈棕黄色，体很輕，断茬軟如絨，內含大量咖啡色的粉末，用手碰后即飞揚。

用 途: 清热解毒，适用于咽喉痛及咯血失血等症；外用治疗传金疮冻疮，肿痛等症。

包 装: 席或麻袋，布袋也可。

貯 藏: 防潮，置干燥处貯存。

十 一 划

牽 牛 子

別 名: 江梁子、二丑、黑白丑。

產 地: 河南各地都产。以新乡商丘专区产量最大。多

种于庄园地边缘处。

產 季：秋后产新。

產地加工：果实成熟后連秧割下晒干，打下子(种子)，揚去土杂(或用风車)即为成品。

商品规格：不分规格，以无土无石子，純淨的为好。新乡产品分为二种：白丑(全是白的)、黑丑(全是黑的)。

鑑別方法：本品是三角形种子，一面圆，二面平，略似荞麦粒，黑丑色黑(一般較多)白丑色黄白。破后，仁均为黄白色很粘。

用 途：攻下，利水及杀虫，适用于大便秘結、腹肿、水肿及脚气，胸悶，气逆，喘胀者。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮。

連 翘

地 名：連壳，空壳(許昌专区的魯山)。

產 地：主产于太行山及伏牛山区；洛阳专区的灵宝、卢氏、嵩县、陕县、伊阳、欒川、新乡专区的輝县、南阳专区的泌阳、内乡、西峡等地。

產 季：霜降前产品青綠色，称为“青翘”。霜降后产品均开裂。黄色称为“黄翘”为一般商品。

產地加工：霜降后果实裂开用手擣下，或打落于地上，扫起过篩，除去土杂即为成品。

霜降前采者，色青綠为“青翘”，采后置鍋中焯一下、晒干后，过篩除去籽。

商品规格：連翘(指黄翘)不分等級，以黄色，壳大，无

籽把为佳。以其純淨程度分为：淨貨（无籽无把）与毛貨（有籽有把）。

鑑別方法：黄翘色棕黄，均为完整的半片果皮，佳品应当是无麻壳（麻点）不朽、不发黑、壳大的裂片。青翘个稍小，色青綠。味微苦，无香气。

用 途：清热解毒的功用，主要用于脓疱疮丹毒瘰癧結核，諸种疮癤及多种热性传染病与化脓性疾患。

包 装：席包。

貯 藏：防雨（雨淋后发黑，質量变低）可放数年不坏存放愈久色愈黄，所以陈貨为好。不生虫。

紫 苏 子

別 名：苏子。

產 地：許昌专区禹县、长葛两县主产，商丘，新乡专区也产均是栽培。

產 季：三月下种，秋后八月初产新。

產地加工：紫苏分两种，一种是专供采子的（种植的株距大，約一尺以上，长得高，采收的晚）；另一种是专供采叶用的（株距小，长得矮，不等开花时即采叶或割下全株入窰）。

采子的紫苏，秋后八月初，等叶呈紫紅（上下两面全是紫紅色）时，割下地上部分，晒干，打下子，过罗去土及杂质，即为紫苏子，打下子之秧作“紫苏”出售。

下部老秧（茎）作“苏尖”出售。（上海称此为“紫苏头”。）

商品規格：苏子不分等級，无土、无杂、个匀的为好。

鑑別方法：河南省产的苏子个小（称小苏子），类圆形，大

似菟絲子，表面深灰色帶花紋（花紋不如大蘇子明顯），微有香氣，破碎後香氣濃，並帶油性。

江蘇蘇州產的個大體泡（約有小蘇子2~3倍大小）花紋明顯，氣味小，質次。

另有：“白蘇子”，大小與大蘇子相同，但色白。

用 途：降氣滑痰治喘息上氣，及一般咳嗽多痰等症。

包 裝：雙麻袋，

貯 藏：防潮。

紫 蘇 葉

產 地：主產於禹縣，長葛。

產 季：秋季7—8月。

產地加工：供採紫蘇葉的蘇葉，葉上面綠色、下面紫紅。秧長得矮，不等其開花時即割下全株陰干（日曬後色不綠），連葉帶秧切成寸段當紫蘇葉入藥。

也有稱此帶梗的貨為“全蘇”，摘下淨葉陰干後作蘇葉的。

商品規格：以葉大、質厚、嫩、整齊、不碎，背面紫色，有香氣者好。

鑑別方法：呈廣卵形，表面綠色，背面紫色，結蘇子後的葉稱仁子葉，顏色顯黃綠，不發紫，質地亦薄，香味亦較差為次貨。

用 途：去風發表解熱，可用於傷風感冒初起，惡寒發熱，鼻塞，咳嗽多痰等症。

包 裝：席包

貯 藏：防潮（見潮後發黑）防日曬（日曬後發白）。

苏 梗

別 名：紫苏梗。

產 地：禹县、长葛为主、商丘专区也产。

產 季：秋后产新。

產地加工：拔出后晒干即可。

商丘专区出产是以采集苏子为主，故晒干，打出苏子，修削根部而作苏梗出售。

禹县产的，晒干之后将上部細枝折断連吐用，入藥为苏叶，而残留之梗即为苏梗。

商品規格：不分等級，不发黑，不霉烂为好。

鑑別方法：本品为地上部分入藥，通体紫紅色，长约2~3尺，粗有如筷子，其上端残留的包筒（残留的萼片）无叶，茎方形，断面白色，中間松软如向日葵心。

用 途：主要能去风，发表，解热可用以伤风感冒初起，恶寒发热鼻塞，咳嗽多痰症，兼能安胎平气。

包 装：席包。

貯 藏：防雨，防潮，干燥保存。

紫 河 車

別 名：胞衣，胎盘。

產 地：各产院皆有。

產 季：四季。

產地加工：取无病的健康产妇，娩出的胎盘用水洗净，去掉筋膜，置帘子上干燥，亦有烤干的。

商品規格：无病产妇之胎盘，紫紅色者佳。

鑑別方法：本品呈扁平形，紫紅色，或紅黃色，上面有微細血管和臍帶質堅韌。

用 途：①滋補藥治男婦虛弱，亏气，亏血肌肉消瘦等症。

②治咳嗽吐血好忘恍惚夜睡不安夢遺泄精癩癩等虛弱之症。

包 裝：木箱。

貯 藏：干燥通风处保存。

紫 稍 花

產 地：主产于南阳专区的白河（南阳县）。

產 季：秋冬季产。

產地加工：采集方法是秋冬季，待河水退落后在河床或池边拾取之，切去两端树枝或杂草即为成品。

商品規格：不分等級，以体輕身干无泥，内部树枝少，杂草小无杂质者为好，放年久的陈貨多破碎，脫落，質量变次。

鑑別方法：本品是不規則形的团块，褐黃色，質輕，松软易碎，外形略似蒲棒，但形体不整齐，灰褐色，詳細觀看有灰白色圆形小粒子，其中，振搖之可脫落。体輕，質松，易碎。

用 途：益阳，秘精，阴痿，遺精，小便失禁。

包 裝：竹篾。

貯 藏：防雨淋。

其 他：据講紫稍花是蝦在池沼中的树枝或草根等物上所生的卵而結成的块状物。

紫 荆 皮

別名：烏桑皮。

產地：主产于嵩县、內乡馬山口等地，南阳专区亦产。

產季：春季。

產地加工：将树砍倒，剥下树皮后，晒干即成。

商品規格：不分等級，以身干条长，皮厚，外皮光滑的为好。外皮似蛤蟆皮的次。

鑑別方法：本品为紫荆树的皮，向內卷曲，外皮呈灰白，里面紫褐色，易断能对折对断，断面为紫紅色对光能看到发亮的小点。

与相似皮类的区别：①肉桂，有香味，皮上有云彩。

②厚朴：味辣且鑽舌头，有油性。

用途：解热，消肿。

包裝：打成捆。

貯藏：防潮。干燥保存。

紫 草

別名：湖紫草，山紫草。

產地：信阳专区名为湖紫草，洛阳专区为山紫草。

產季：秋季霜降出土。

產地加工：挖出土后，晒干捆成約重11—12两的小把，即可。

商品規格：分硬軟两种，硬者为山紫草，軟者叫湖紫草。

鑑別方法：本品为不整齐的扭曲的根，上头大，下头小，

(紡垂狀或園柱狀)有主根及側根，外表暗紫色，有溝紋。縱紋深及木部外皮較松，折斷面中心紫色，肉白，間有暗褐色色層，體長約3—4寸，粗如指頭，易碎者為好，橫面長6—7寸，根外皮紫內白如黨參，此種則次之。

用 途：涼血，預防麻疹，發表。

包 裝：山紫草，席包。湖紫草用麻袋。

貯 藏：夏季怕潮，怕蟲，過端陽節得炕一次。

其 他：市面出銷為山紫草——只有外層有一層紫色，內層皆為木質心，其質較次。

蛇 蛻

別 名：龍衣，蛇皮，長蟲皮。

產 地：各地都產，主產於信陽、南陽、洛陽專區的山地。

產 季：春季。

產地加工：拾到後即成。

商品規格：以色白，皮細，長條，整齊不碎，無灰土雜質為佳。

鑑別方法：本品為蛇所退下之外皮，筒狀長條之皮膜，表面有鱗片，銀灰色有光澤。長數尺，體很輕。由蛇上剝下的皮不入藥。

廣西產的：色白皮粗。湖南產的：色發黑。

用 途：1.味咸性寒，故主治一切風邪，能引諸藥入肝經，可用於小兒驚風，癲癇，癩癧，搖頭弄舌，言語滯澀，小便不利等症。

2.能解辟惡殺蟲，可用於腫毒，瘰癧，喉風目翳，頭面生

疮，可内服并可外敷。

包 装：布袋。

貯 藏：防潮，防霉。

野 猪 皮

產 地：大别山，伏牛山区。南召，内乡为主要产地。

產 地：四季都产，秋季較多。

產地加工：野猪棲息于深山中，猎人猎取后剥下皮，皮内面舖以爐灰或砂石上晒至半干，以刀割为长条或整张晒全干即成。

商品規格：以皮厚，身干的为好。

鑒別方法：本品是野猪的干皮，質坚体重，有为1—2寸寬的长条，有为不規則形的全长猪皮，外面灰黑色，有較深的皺紋，生有粗壮的黑毛似猪鬃，内面黃紅色，似腊質，坚硬。有腥嗅。

用 途：外用，生肌长肉。

包 装：一般不包装。

貯 藏：防潮貯存。

其 他：过去充象皮是伪品。

陰 起 石

產 地：禹县、信阳。

產 季：四季都产。

產地加工：挖出后即成。

商品規格：沒有規格，以不含杂質的为好。

鑑別方法：本品是矿石为不規則的块状物，質重但很疏松，呈淡紅色且发亮，整体有成束的針状結晶構成，（像木纖維一样）用手搓捏后即成針状閃光的結晶形粉末，并有滑潤的感觉得，放在身上即发痒。

用 途：壮阴。

包 装：席包。

貯 藏：防雨，勿露天放置。

其 他：阳起石外表发青。

蛇 床 子

產 地：各地都产，均是野生，多产于河坡上。

產 季：秋季（八、九月）。

產地加工：果实呈黄色时即成熟，此时将其果实用手撸下，晒干，簸淨杂质。

商品規格：不分等級，以无土、无把的为佳。

鑑別方法：本品椭圆形的果实，由二个分果合成，外面平滑呈淡黄褐色，通常有10条稜綫，气味似松节油稍辣，与胡蘿卜子之区别：胡蘿卜子形与此相似，有黄色的白毛，蛇床子沒有毛。

用 途：除濕，止痒，壮阳主治男子阳萎不起，女子子宫虛冷等症，外用作膀胱剂，可治阴囊濕痒，阴門搔痒等近用于治阴道滴虫。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮防霉。

甜 瓜 子

產 地：各地都产，均是家种。

產 季：二、七月产新。

產地加工：吃甜瓜時，倒出籽，以水淘洗干淨晒干即成。

商品規格：不分等級，以身干，飽滿、純淨，不霉的為佳，變黑發霉的為次。

鑑別方法：是粉白色的扁干種子，長約2分，寬約1分，外皮光滑，咀尖尾圓很似瓜子，但略長而無雙邊，內有白色種仁以瓜子仁。

用 途：解表、清肺、潤腸。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防鼠咬，防雨（見潮發霉）。

荷 葉

別 名：蓮葉。

產 地：河南各地都產。多產于池塘水多處。

產 季：九月產。

產地加工：葉采下後，晒至8—9成干時，折疊起，將葉柄部向上再晒干即成。

商品規格：以黃綠色葉大整齊，不破碎不發霉的為好。

鑑別方法：為黃綠色，圓形完整的葉，上有筋狀的紋，中間有一圓形結口。

用 途：①為收斂藥，用于慢性衰弱之腸炎，久下痢，腸出血，慢性子宮炎，赤白帶下，男子遺精或夜尿症，又為解毒劑治菌蕈中毒。

②升清散痰，消暑，化熱，治血淋，崩中，脾虛，泄瀉等症。

包 裝：席包。

貯 藏：干燥保存。

側 柏 葉

別名：柏树叶，柏叶。

產地：河南各地均产。

產季：四季均产。

產地加工：采取后去掉較粗的叶柄阴干。

商品規格：以青綠色，叶片整齐，不帶粗叶柄及树枝，而純干者佳。

鑑別方法：本品以側柏的叶子供藥用。叶呈鱗片状，色青綠，味苦，有柏树香味。

用途①为凉血止血要藥，适用于一切出血疾患如吐血，鼻血，腸风下血，血痢，及妇人由血热所致的子宫出血都有效。

②治冷风历节疼痛，有止血消炎之用。

包裝：打捆席包。

其他：炒黑者止血用，生用破血。

淡 竹 叶

別名：竹叶，野竹叶。

產地：主产于信阳专区的新县、光山，固始商城、罗山等县，野生。

產季：四五月間在开花以前采集。

產地加工：拔出捆成小把，晒干即成，晒时要一次晒干（遇阴天吃潮后再晒，即变白色。）

商品規格：不分等級，以身干，色青，不帶根，不帶花穗的嫩草为好，杆太粗，帶花，帶根，或吃潮后色发白的为次貨。

鑑別方法：本品是地上全草，叶根似竹叶，比竹叶稍寬而大，叶薄而軟，叶长可达4—5寸，寬約一寸上下，杆軟

質輕綠色，下部有疙瘩狀莖節，少數生有黃色須根，味甘，有特異清香氣。

用 途：①淡竹葉，甘寒涼心，解渴止煩，除上焦風邪煩熱。

②止胃熱嘔噦，吐血。

③治胸中痰熱，咳逆上氣。消痰解渴。

④止驚悸，小兒驚癇天吊。

包 裝：外夾竹皮打捆。

貯 藏：防潮（發霉），防日晒風吹（發白）宜放室內。

淡 豆 豉

別名：豆豉。

產 地：各地中藥人員自制，用黑豆做原料。

產 季：春秋季均可制作。

產地加工：取黑豆五斤，檢去雜質，放入鍋內煮八成熟，以水干為度，煮後將豆晾至不粘，放入蒲包內，放時，放一層黑豆加一層青蒿。共用青蒿一斤，（將杆去掉）。裝好後，悶五天取出，如生有白毛即算做好，如果沒有白毛則洒一次開水再悶，使所有黑豆都長白毛即算做好，曬干後即為成品。

商品規格：不分等級，以帶有白毛，不爛，不生蟲者為佳。真正地道的豆豉，應當用蘆葦地中生長的小黑豆（葉小豆角小，豆也小）制做者為正品。但現在均用一般的黑豆做，也有用個大的藥黑豆制做的。

鑑別方法：本品是加工過後的黑豆，外皮多有皺紋，微帶灰白色毛狀物。豆皮發糟易脫落，斷茬棕色、有發酵氣味。

用 途：熱病初起，寒熱頭痛，胸中懊惱煩熱等症。

包裝：布袋放干燥处，防虫蛀。

貫 众

別名：神箭根（南阳，信阳）

產地：主产嵩县、洛阳、内乡、信阳等地，其他地区也产。

產地加工：挖出后晒至半干用火微烧，除去须毛再晒干即成。

商品规格：不分等级，以干净，个匀整齐，不带须根，叶柄及残茎部份短的为好。

鉴别方法：本品为长园形微弯的块状全体有刺（棕色的膜片）形似菠蘿，内外均呈棕色。

用途：为驱蟒虫及介热毒，避瘟止血，（妇女崩漏，带下等症。）

包裝：席包。

貯藏：放于干燥通风处，易受潮濕生霉。

望 月 沙

別名：野兔子屎。

產地：各地均有。

產季：冬春二季。

產地加工：由野兔的洞中收集起来就是成品。

商品规格：以黄褐色，园球形，不破碎者佳。家兔的粪，园形黑色。不供药用。

鉴别方法：本品为园球形，略扁，黄褐色，内部粗糙有草質，質輕易碎。

用途：明目。除目中浮膜五疳杀虫解毒之用。
包装：麻袋。
贮藏：干燥保存，以防受潮而散。

猪 苓

产地：主产洛阳专区的嵩县、卢氏，南阳专区也产。

产期：四季都产；冬春农闲时产量多。

产地加工：猪苓常寄生于柞树、槭树、山毛榉等树木的根部，在大树的周围或在无林地区生长，在冬季落雪后先化，和雨后水先干的地方采挖，采挖后晒干即成。

商品规格：以个大、饱满、光滑、色黑亮为好。

猪苓头：色黑亮、光滑、块大、近园形，质坚硬，干燥饱满，茬白色。

统猪苓：色不明亮，不光滑，有砂石为次货。

鉴别方法：本品为猪苓菌的菌核供药用，为不规则的园块，亦有长条的，色黑亮，质坚硬，很易吸水，含水量高，用手握时不顶手，而且能被握扁。内部类白色或淡黄色，质密略带粉性，

用途：解热，消炎，止渴，利尿。

包装：席包，麻袋。

贮藏：置于干燥通风处保存。

其他：有土猪苓及沙猪苓之别，是否为同一品种待查。

淫 羊 藿

别名：山杨叶。

产地：主产于安阳，其他地区也产。

產 季：霜降后。

產地加工：用刀割取全草（不带根），晒干即为成品。

商品規格：不分等級，以身干，色黃綠，叶枝整齐不碎者佳。

鑑別方法：本品是带茎的叶，均是茎上分3叉。每叉上又分3叶。叶为卵圆形，先端尖，基部心脏形，边缘具有刺状的小锯齿。叶面平滑，色黃綠，叶微苦。

用 途：为神經性强壯藥，补精，治阴痿。

包 装：打成捆及用席包。

貯 藏：置干燥处，勿受潮濕。

通 草

別 名：榆叶梅。

產 地：洛阳、南阳两专区皆产。

產 季：初冬或霜降前后。

產地加工 割下后，趁濕用木杆通其髓部去皮留其髓，晒干即可。

商品規格：不分等級，色白，干净者佳。

鑑別方法：本品是純白色长棍状的髓部，粗約1分~2分左右，質輕似紙質易折断，通体有光泽，撕压則有紙碎声，断茬与外观一色，放于水中經久不沉（粗通草似葵花心）并发粘。

用 途：利水、清热、适用于小便短赤，淋閉等尿路炎症。

包 装：席包、竹篾。

貯 藏：防潮遇水发黄而后发黑。干燥保存。

其 他：①通絲为方通（南方产）的边做成的絲。

②假品，实心，有木性，似麻杆，質脆，外皮有皺紋，遇水不发粘性（据說是苏浙地区所产）。

旋 復 花

別 名：羊耳朵花（叶似羊耳朵）。

產 地：河南各地都产。

產 季：七、八月間。

產地加工：在花未开足前采集，采集后放在蘆席上晒干即成。

商品規格：以身干，花朵大，色黄，淨为佳。

鑑別方法：本品以沒有开放的花头入藥，形似菊花，桔黄色，花瓣与菊花略不同，花朵上丛生白色絨毛，呈球形，花朵容易散。

用 途：健胃藥，去痰藥。

包 装：席包。

貯 藏：本品易生虫，过伏必須晒干，貨湿易发霉变质。

密 蒙 花

別 名：疙瘩皮树花。

產 地：南阳专区老河口，信阳专区商城为主产区。

產 季：春天收集（正、二月間）。

產地加工：将花撈下晒干，拣去叶，枝，皮等即可。

商品規格：色青綠，沒叶，干燥为好，（陈貨为土黄色）。

鑑別方法：本品为多年生乔木的花蕾，在冬天萌发，春天

长成采取。其叶似冬青但稍园些，花干后呈土黄色，有短短的绒毛，为多个三角形花（一边有并排的三个突起）聚生在一起而呈葡萄串状，无味无臭。

与山蒙花之区别：

山蒙花：叶大，毛茸多，色淡黄。

用 途：眼科用藥，退云翳明目，主要适用于目中翳障，风火眼痛，紅肿流泪，羞明畏光等症。

包 装：席包。

貯 藏：防潮（受潮变黑），不易生虫。

梔 子

別 名：枝子，山枝。

產 地：信阳专区。

產 季：八、九月間采集。

產地加工：采下后晒干即成，又于鮮时搦下呈青色、放入鍋中蒸一下再停火少燻至变黄晒干即成。

商品規格：身干、小个、紅色，剝去外层黄紅色皮，其种子不变質为佳。

鑑別方法：本品为长园形，长约5——6寸，两头稍尖一端留有萼片，整体有六条稜，皮紅黄色、仁紅，里面有很多小的紅黑色的种子，其粉末入水，則溶于水中水呈黄色。

用 途：消炎介热，对黄疸、吐血、衄血、利尿有效。

包 装：麻袋，外省用竹筐。

貯 藏：置干燥通风处。

其 他：湖南貨（野生）。称老瓜咀（有五个萼片）一长条也称“灯笼紅”。江西貨称火胡蘆个，体园，色紅。

梭 罗 子

別 名：罗汉果。

產 地：嵩县，西峡产之。

產 季：9—10月收摘。

產地加工：由树上打下，打时外皮已破裂，当日晒干，剥落。外皮即成。

商品規格：不分等級，以个均匀飽滿，沒經虫蛀不变質为好。

鑑別方法：由树上打下之后，帶有青色外皮，状似青核桃，皮上有紅色小点剥去外皮好似毛栗子，但其上有凹凸不平的不定形窩，外觀为棕黑色或棕紅色，背面有淡土紅色部份花萼，再去棕黑色皮內层显出干的，栗子色的坚硬的肉質；肉質部份折断則显粉灰色茬，質坚实而重。

用 途：治胃疼，心疼。

包 装：箱子（防外皮脫落因外皮也治病）。

貯 藏：防潮。

麥 冬

別 名：寸冬，麦門冬。

產 地：信阳专区，新县等地。

產 季：春、秋、冬均产。

產地加工：挖出后，洗去泥土，在开水中打一滾（即少煮片刻），捞出来晒，晒半干时，用手搓，讓其油質透到皮上，色鮮，好看，晒干后簸去其須毛，即成。

商品規格：身干，色白，肉飽滿不霉的为佳。

鑑別方法：本品是麦冬的地下部分供藥用，通体呈类园柱体，两端少尖，为白色或淡黄色，其表面有深浅不等的皺紋，断茬有白头，手摸之有韌性，有特殊香味，少吃先甜后微苦，全长約有4——8分左右。

用 途：主要功效为甘寒，清热，养阴，主治胃絡脈絕，安魂魄，治經枯，下乳汁，脈微若絕等症。

包 装：木箱或麻袋。

貯 藏：防雨，防霉，干燥通风处保存。

麥 芽

別 名：大麦芽。

產 地：各地藥店自制。

產 季：夏季五、六月。

產地加工：将大麦用水泡半天，然后用蒲包，包着放在潮濕的地方，每日洒水四——五次，等芽出3—4分晒干即可。

商品規格：本品不分等級，以質充實，芽长3—4分，黄色为佳。

鑑別方法：为紡錘形之长园粒，基部生长3—4分之黄色芽，外部有层黄白色之皮，并有一道順溝稜，内含一粒种仁，切断面白色有粉質味甘。

用 途：补虛，消食，健胃，和中下气，通乳。

包 装：麻袋。

貯 藏：易生霉变質，保管时应放干燥通风处。

其 他：濕大麦芽，亦可作飴糖。

細 辛

別 名：山細辛，独叶草。

產地：洛陽，南陽，信陽三專區。

產季：秋冬之間。

產地加工：挖出後曬干即成。

商品規格：不分等級，以根大，葉綠，無泥土為佳。

鑑別方法：全草帶地下部分供藥用，地下根草黃白色，有明顯的節自根莖生多數細長的根，折斷後呈白色。

山細辛：本省產的根粗似稻根，葉亦較大，氣味短。

遼細辛：遼寧產的，根細葉小，氣味較長。

用途：能發汗祛痰，治喘咳及感冒頭痛，散風邪諸風濕痹，咳嗽上氣等。

包裝：席包。

貯藏：干燥保存。

其他：信陽專區產的稱馬蹄細辛。

商 陸

別名：山蘿卜。

產地：各地都產。多產於靠水的山地。

產季：冬季產。

產地加工：挖出後（形似白蘿卜），除去秧苗及須根，切厚片（橫順都有），曬干即成。

商品規格：不分等級，以片大而厚，淨貨為好。

鑑別方法：本品是商陸的地下部分入藥大小不等，形狀不同的厚片，片皮紫色、肉黃褐色，皺縮不平，橫片有一環又一環相套的花紋，順片有順條的花紋。片子微有彈性，木質。味甘、微苦。

用途：利尿，消腫，治水腫，腹水，肋膜炎等外敷用治無名腫毒。

包 裝：席包。
貯 藏：防雨。

葛 蒲

別 名：九节葛蒲，九节离。

產 地：主产于洛阳专区灵宝，卢氏和洛宁，南阳专区的西峡，南召，其他地区也有产。野生。

產 季：小滿前后十五天至二十天（过期則苗枯干，不易找到）。

產地加工：挖起后除去秧苗及主根（根茎），选取小根放竹籃內在水中淘洗，去淨沙土，晒干即可。

干后成品也可用硫黄熏之，其色較白。

商品規格：以身干肥大，色黄白，长寸許九节者为佳。瘦小，枯干，色黑軟者次。

鑑別方法：本品是弯曲的根。通体粗細不均，两头稍細，长約寸許，粗約一分，全身有突起的环状节（多系九节，故名九节葛蒲）外皮淡棕黄色質坚皮細，易折断，断茬粉白色。味微酸。

用 途：①开心孔通九窍，霍乱轉筋等症。

②溫腸胃，除风下气，止心腹痛等。

包 裝：內銷用麻袋裝，出口用箱裝（防压碎）。

貯 藏：放干燥处，防潮、防虫（四、五月易生虫，应凉晒或用硫黄，若放硫黄房中不动即可）。

其 他：①葛蒲有人将粗大、弯曲的主根（根茎）称为“重楼”。

②另有“水葛蒲”产四川，湖南。通体光滑无

节，体糠質泡，易生虫南方用，北方不用。

兔 絲 子

別 名：繩龙子

產 地：河南各地都产，均是野生，多生于豆地。

產 季：秋后八月产新。

產地加工：因寄生于大豆或其他植物上，当其种子成熟时，可与寄生（寄生的植物）一齐割下晒干，打下子，用細眼篩子将兔絲子篩出，然后除淨杂质即成。

商品規格：不分等級，以个整齐，无土純淨的为佳。

鑑別方法：通体較小（大小似苏子）为淡褐色，外皮无紋，質坚硬不易破，味苦，煮后发粘，作成餅入藥。

用 途：为滋养性强状藥，补肾，添精縮尿，适用小便过多，遺精早泄，腰膝痛，及虛热口渴等症。

包 裝：双麻袋。

貯 藏：防潮濕防虫蛀。

其 他：入藥时先以甘草水泡煮一次，再蒸一次，取出后碾一下即作成餅，作兔絲子餅入藥。

萊 服 子

別 名：白蘿卜子。

產 地：商丘专区为主产，新乡、南阳、許昌等专区也产，均为家种。

產 季：三月种，五月收（割麦后）。

產地加工：将全株割下晒干，打下种子，簸淨杂质，即为成品。

商品規格：为紅褐色或黃褐色的子粒，充實飽滿，無土，純淨者佳。

鑑別方法：本品为椭圆形稍扁平，紅褐色的种子，表面有皺紋，味辛。蘿卜子（种菜用），色稍紅，个大，稍扁，应注意区别。

用 途：下气定喘，消良化痰，咳嗽痰喘，胸悶腹胀，气滯作痛，下痢后重等症。

包 装：双麻袋。

貯 藏：防潮。

其 他：本品不可作蘿卜子种植，种后不久即出亭开花种子，而不长蘿卜。

琥 珀

產 地：主产南阳专区的西峡县。

產 季：四季产，冬春产的多。

產地加工：与矿产开采相同。

商品規格：以透明的为佳，以块的大小分三等。

一等，一寸見方以上，无碎面；

二等，三分至七、八分見方（呈大顆粒状）；

三等，三分以下，有碎面。（过去分为六个等級，現在都合为此三个規格）。

鑑別方法：本品为松柏科植物树脂，埋藏于地层中，經久而变成化石树脂为紅色或黄色半透明 整齐之块，类似松香，大小不一，質酥易碎，燃烧时有松香之气味。

用 途：①有散瘀活血的功效，瘀血散則疼痛止，故用产后瘀血腹痛。

②利小便，安神之功，可治五淋，小便渾浊，

尿道刺痛及心神不宁，多梦易惊等症。

包装：纸包。

贮藏：严防潮湿，以面粉袋或木箱装后置于干燥处。

其他：假货：“琥珀璫”是用松香伪造的，本品不分层，入口咬时咯牙、粘牢，见火就烧，燃后以手接触燃烧处可拉出长丝。真琥珀没有这些特性。

款 冬 花

别名：冬花。

产地：主产于洛阳专区嵩县、栾川（黑峪镇）、卢氏各县。家种及野生，均生于背阴，靠水潮湿的地方。

产季：三、四月种根；冬至后（十一月间）产新。

产地加工：冬花生于土内（似落花生），冬至后把根茎挖出晾微干，此时不能晒（变色），打去泥土后，带手套（直接接触手会发黑）摘取花，然后再阴干，阴干时用竹竿翻动把梗去掉即成，在雪天如不及时晾干，颜色即变黑。

商品规格：花紫色，苞硬，纯净，光亮没有把，花蕾多的为佳，发黑、色淡为次货。

鉴别方法：本品是未开放的花蕾，色气，外形都象未开的桃花，味微苦带粘性，有似杭菊花的甜味，冬花长出土后花多变青色即开花。

以嵩县产品最好，花较大紫红色单朵。

用途：润肺止咳、消痰下气主治咳嗽、气喘、喉痹、肺病、肺痿。

包装：箱装，内衬油纸。

贮藏：防潮，夏季最易生虫，可用硫磺熏之。

菊 花

別 名：怀菊花（产武陟、博爱）、大白莲、毫菊（产商专）、甘菊。

產 地：新乡专区的武陟、博爱为主产地。許昌专区禹县等地也产。均是家种。

產 季：清明节前后栽种，寒露开花，霜降前后摘花，霜降前摘的花色白質佳，过夏后色变深，霜打后的菊花色发紅質次。

產地加工：花全开时，将花带把摘下，倒挂繩上晾微干（防悶发霉），然后摘去把，放帘上晒干。晒时要一次晒干，不能悶（悶后发霉变黑），摘花时要随开随摘，不能等全开后一齐摘。

另法是：連秧割下，打捆倒挂晾微干，剪下花头再放薄上晒干即成。

将晒干之菊花，噴洒少量水（每百斤用水2~5斤），使花潤后，花朵不易散碎，然后用硫磺熏（每百斤菊花用硫磺1斤），熏后色白鮮艳，打包后不起热。

商品規格：以朵大色白（俗称大白莲）不霉、无土（过去怀菊花有掺入沙土的）的为佳。

鑑別方法：新乡专区产菊花称怀菊花，花朵稍小，有花心（以手按之有硬心）黄白色，色气少发暗，带粉紅色，气味稍小。多是未全开的花朵，过夏后散朵。

前商丘专区产菊花較大，沒有花心（手按之无硬心）色白发亮，是全开的花，过夏后不散朵。香味較浓。

另有杭菊花，朵小色黄，花瓣完整，气香而长。

用 途：①辛凉輕解，可治身上一切逆风。

②平肝息风，可用于风旋倒地，脑骨疼痛。

③除烦，明目，主治目赤，多泪，疔疮肿毒等症。

包 装：亳菊多装箱。怀菊花，是硫磺熏后，装在打包用菊花膜内（膜内铺布），用压杆将菊花压紧，缝好布包即成，每包长2尺4寸，高2尺，宽1尺，净重100斤上下。

貯 藏：防潮。置干燥通风处保存。

黄 丹

别 名：彰丹。

产 地：主产在安阳市（彰德府），南阳专区余店产量大，禹县也产。

产 季：四季都可产。

产地加工：用生铅为原料，入锅内炒黄，上碾碾碎，（另加其他原料）过细筛则成。

商品规格：不分等级以橙红色细粉能上墙，手摸后光滑无粒，放咀见水后不成疙瘩的为好。

鉴别方法：橙红色粉末质重。含有大量黑铅或氧化铅，硝黄，盐矾等物。

用 途：熬膏药，刷黄红纸。

包 装：纸封（河南产一斤一包）木桶（50斤一桶），现改为100斤一桶。

貯 藏：防潮，防止成块（受潮易结块）。

其 他：湖南丹：粉细，光滑，无粒，色重橙黄色。彰德府的粉粗不上墙。

余店货：介于以上二者之间。

黄 蜡

别名：蜂蜡。

产地：主产于：洛阳、南阳、信阳各专区的山区。

产季：十月以后产，春季也产。

产地加工：黄蜡是蜂巢中的蜂蜡。割下蜂巢，放布袋中搾取蜂蜜，后剩下的渣子，放锅里加水煮热，使其溶化，除去上部的泡沫杂质，将下部蜡液用布过滤到碗内，使凝结成块即成。

商品规格：以深黄色，体轻，无杂，能浮于水上的为好。淡黄色者多有伪品掺入。

鉴别方法：黄蜡多是圆形的团块，黄色质轻，以手推摸发涩，不光滑有油腻的感觉，入口嚼之没有渣子，可成很薄的薄片而不碎。掺伪品：①掺入豆面的，色淡黄，咬后不成薄片易碎。②掺入石蜡的，手推之光滑，用指甲推滑，可有碎片脱落。

用途：①收涩固脱可用治下痢脓血，经久不愈者。

②外科常用似收膏。

③溶化后乘热敷于疼的部位或关节，能治骨节疼痛及酸软无力，亦有物理温热刺激的功效。

包装：布袋等皆可。

贮藏：防止受热熔化流失，干净保存。

其他：①据言本品愈陈愈好。

②漂白后成白蜡，用于做蜡皮也入药。

黄 柏

别名：山黄柏、黄蘗。

产地：主产于嵩县、卢氏、灵宝、内乡、西峡等地。

產 季：春季。

產地加工：先将树砍倒，剥下树皮，剥掉后，用刀刮去外部之栓皮，晒干后即為成品。

商品規格：以黃色片大而厚，无老片，折断面深黃色，整齐不碎為佳。

鑒別方法：本品是以黃柏树皮供藥用，內外皆呈黃色，商品多呈板狀，多截成長方形條片，栓皮多已除去，厚薄不一，半分至一分五。外表微粗糙，帶纖維性，断面深黃色，味苦。

用 途：能去火，清熱。适用于：①各種熱性病，赤白痢，胃腸炎，黃疸，痔瘡，便血。②各種皮膚疾患。③痿痹，關節炎等又為提取黃連素（小鹼藥）的主要原料。

包 裝：打成方形大捆。

貯 藏：防潮，干燥保存（以防發霉變質）。

其 他：1. 關東黃柏：張大皮厚，一般2尺寬，3—5尺長，厚2—3分外面不留栓皮，內面黃色光滑，能對折對斷，碾后無絲有粉性。二頭切齊。

2. 川黃柏：張小皮亦薄（半分后）外面不留栓皮，內面黃色質輕，不能對折對斷，有纖維性，碾后有絲。

3. 山黃柏：（產河南）張小皮薄外面留有栓皮，顏色呈黃黑色不易折斷，碾后有絲。

在中藥界習慣認為關東黃柏最好，川黃柏次之，而河南黃柏最次。一但從黃連素（目前已用于臨床對多種病有效如肺結核等）的含量看，反而以川黃柏，河南黃柏較多，而關東黃柏較少。

黃 精

別 名：山姜、鷄頭參。

產地：洛陽、信陽、南陽、許昌、新鄉等專區野生。

產季：秋季。

產地加工：挖起後，水洗去泥土，置蒸籠中蒸過後用手剝去皮曬干即得。

商品規格：不分等級，以個大色黃透明為佳。

鑑別方法：本品多為扁彎曲的條狀物（根莖），有的帶分枝，有些像鷄頭，多在較粗部分，有黃白色鷄眼形（莖痕）。通體棕黃色，有抽皺的順紋和不甚明顯的環狀節，質柔軟，斷茬黃白，油潤，有粘性，味微甜，有香氣。

用途：補中、益氣、又可解熱，驅除蛔蟲，高血壓。

包裝：席包或竹篾。

貯藏：防潮（干燥通風處）。

其他：過去有用蒸過的黃精充熟地，但斷茬有筋沒有環紋。

黃 芩

別名：枯芩（指空心）條芩（指細的）枝芩。

產地：洛陽專區靈寶為主產區，盧氏、嵩縣、新鄉專區的輝縣、濟源（原沁陽）亦產，是野生。

產季：秋季（9月以後，上凍以前）。

產地加工：挖掘根部，切去蘆頭與苗子，曬干後再撞去皮（放條筐中內加石頭子）即成（現在洛陽專區不加石頭撞）。

商品規格：以堅實、粗長，除淨外皮，色黃，斷茬金黃色者為佳。其規格為：

(1) 條芩：指粗、條長、外皮光滑，無糟皮，7寸至1尺長，斷茬金黃色，實心。

(2) 枯苓：粗細不一，內有朽心，朽心部多破裂，黃苓雨淋或見生水，則斷茬發綠，質量較差。

鑑別方法：本品為黃苓的根呈圓柱形粗細均勻，順長直條，表面有抽紋（深凹紋）色黃，長約5~6寸，斷茬金黃色味苦。（條苓）。

枯苓：為較粗大的根，順條上部大多有明顯糟朽狀之黑褐色枯心。

用 途：清熱止血，可治肺中有火，熱痰等肺熱病，頭痛失眠，嘔吐，心部痞悶症，少陽病，腹痛下痢及有出血傾向的熱性病。

包 裝：席包（100斤上下）。

貯 藏：易生霉變質，置於乾燥不潮濕處保管。

其 他：估計生長1—2年的為佳年久則空心。

黑 芝 麻

產 地：各地皆產，駐馬店為集散地。

產 季：早芝麻清明後種植，六、七月收。晚芝麻，麥後四、五月種植，六、七月收。

產地加工：收集後把它打成捆，垛上悶4—5天，把葉子悶爛，再曬幾天，然後把子打下，曬，簸淨即成。

商品規格：籽大無葉，無土，貨乾淨者佳。

鑑別方法：本品為扁平卵圓形之小粒，黑色含油類。

用 途：益肝，養血，潤燥。

包 裝：布袋，雙麻袋。

貯 藏：貯存時防潮與鼠咬。

黑 桑 椹

別 名：桑椹子，桑食。

產 地：各地都产。

產 季：小滿到芒种采收。

產地加工：果实成熟后，把它摘下，晒干即成。

商品規格：以身干，个大，肉厚紫黑色的为佳。

鑑別方法：本品为黑桑的果实，成串生长，整体像許多小疙瘩带柄。

用 途：补肾，养血，明目，去风。

包 装：麻袋。

貯 藏：干燥通风处保存。

猫 爪 草

別 名：猫爪儿草。

產 地：信阳专区。

產 季：十月。

產地加工：由地挖出，切去地上苗叶，晒干即成。

商品規格：不分等級，以黄褐色，肥胖飽滿，質坚实，断面白色为佳，色发黑，生霉，瘦长，干瘪，質軟者为次貨。

鑑別方法：本品是猫爪草的地下部分入藥，形似猫爪（故名），其下有5—9个块根聚生于根基上，每个块根只有大米粒大小（但較米粒更瘦些）状似猫指甲，土黄色或棕黑色块根坚实，断面白色。在块根聚生的上面还残留一小段棕黄色的残茎，或茎秧落掉后的痕迹，在根基上，有的也伴生着不长的須根。

用 途：治疗淋巴結核（据說有特效）。

包裝：麻袋，布袋。
貯藏：防潮，防雨，晒干后干燥保存。
其他：原植物性状描写如下：

全草长约6.0—10.50公分。

根：同鑑別所述另外在顯微鏡下可看到淀粉粒。

叶、形态：

1. 大小：长约0.5公分，寬約0.8公分。
2. 顏色：綠而帶紫色。
3. 叶片：掌状复叶。
4. 叶尖：銳形。
5. 表面：有白色短毛。
6. 叶序：互生。

顯微鏡观察：有不定式气孔。

茎：1. 顏色：上綠，中下微紫，底部白色。

2. 表面：与叶連接处有白色短毛。

花：1. 大小：长约0.5公分，寬約1公分。

2. 顏色：黃。

3. 花冠：輪状6瓣。

4. 花萼：5瓣綠色，邊緣淺黃色。

硫 黃

產地：洛陽专区。

產季：常年產。

產地加工：取矿石煉之即得。煉法各地不同。

商品規格：色黃鮮亮，不帶黑根即基部沒有黑色雜質。質蘇者佳。

鑑別方法：本品为炼制品、大方形体、黄色、断面有許多小孔，有臭味，点燃后气味更大，有刺激性。

用 途：1) 內服壯阳道，可用于虛寒久痢，滑泄，命門不足，阳气暴絕等症，

2) 外用杀疥虫，治疮癬。

包 装：成块用麻袋包装。

貯 藏：干燥，防雨，防潮，防火。

其 他：防火，易燃。

寒 水 石

產 地：禹县、登封。

產 季：四季皆产。

產地加工：由石矿中挖出即得（多夹于大青石中，去青石而得）。

商品規格：沒有石头，长透为好（即为純的）。

鑑別方法：本品为乳白色，带有淡粉紅色矿石，断面按不同方向裂开，色泽光亮，有晶体的結構。間有其他矿石共存一起。

与白馬牙石之別：白馬牙石不整齐。晶体結構不明显。

与紫石英之別：紫石英为小方形淡紫色結構的矿石。日久則变成苏粉子。

用 途：泻热，降火利水明目眼科用藥。

包 装：任何容器皆可。布袋也可。

貯 藏：防日晒，雨淋露天存放。

陽 起 石

產 地：信阳专区。

產 季：四季都產。

產地加工：是礦石，生于石縫中，開采時挖出即成。

商品規格：不分等級，以發亮，手捻易碎的為好，夾有石塊的為次。

鑑別方法：體比一般石頭重，由成束的絲狀結構組成。斷開后呈細絲狀，用手捻之易碎，而成細小的閃光針狀結晶性粉末，粘在皮膚上就發癢。

與陰起石之比較：

陽起石：青白色質地比較硬，斷后絲長，捻碎后為極細的白色針晶。

陰起石：黃紅色質地比較柔軟易折，斷后絲短。

用 途：1、為興奮強精藥，治陽痿不起，肢體厥冷，又治婦女月經變調子宮冷感，不孕症，并有制菌之效。

2、崩中漏下，破了胎中血，症瘕結氣，腹氣，女子腰冷男子陽痿不起，莖頭寒。

斑 蝥

產 地：信陽專區、新鄉專區。

產 季：七，八，九月間。

產地加工：清早太陽出來之前捕捉，撲捉時用蠅拍打，打落后，用竹篾夾起裝入布袋內，然后用沸水燙死曬干，此物有毒，捕捉時宜注意。

商品規格：以體完整，不散碎，不霉爛變質為佳。

鑑別方法：本品以干燥的斑蝥體入藥，體長一寸左右，頭部呈三角形，腹眼大，呈半球狀，胸部生足三對及翅。二對翅分甲翅和內翅，甲翅革質黑色，上面有三條寬廣顯橙黃色的橫紋，有黑色硬毛，內翅呈薄膜狀，淡棕黃色。有惡臭，味辛

烈苦，粉末触皮发紅刺痛起泡。

用 途：斑蝥为辛寒大毒之品，外用則刺激皮肤。临床用以治多年頑癬不愈，治瘰疾，治咽喉肿痛。

包 装：小木箱。

貯 藏：易生虫应用硫黄熏之。干燥通风处保存。

絲 瓜 絡

產 地：各地均产，家种。

產 季：三月下种，八、九月收。

產地加工：采取后晒干，搓掉外皮，除淨内部种子，即为成品。

商品规格：以黄白色，个大体輕，不带外皮，内无种子，不破碎者佳。

鑑別方法：本品以絲瓜的成熟果实干燥后的筋絡（纖維）入藥，通体为黄白色网状之纖維所組成的长筒体，断面有3个至4个大孔，内藏种子，韌性强。

用 途：清凉性活血藥，通經，治瘫痪症。

包 装：打成小捆，然后外用麻袋皮打成大包。

貯 藏：放于干燥通风处，勿受潮濕。

尋 骨 風

別 名：馬蹄香。

產 地：洛阳、南阳两专区，野生。

產 季：冬春产，冬季产品質量較好。

產地加工：挖出之后，去泥土，去苗晒干即成。

商品規格：不分規格，以色紅黃為好。發霉變黑折之易斷為次品。

鑑別方法：本品入藥是其地下部份，外觀，為粗細均勻，長短不一約在一尺左右，通體彎曲，並有皺紋，間有小疤（節分叉處之痕迹）偶有很細之須根于小疤（節）上，用指甲輕刮外皮，外皮去後木質必為白黃色，此時嗅之香味很濃，本品少有彈性折後不斷，斷茬為黃白色，入口味苦。

用 途：驅風，並可做香料。

包 裝：席包打捆。

貯 藏：防潮，防霉（發黑發酵）。

韭 菜 子

產 地：河南各地都產。

產 季：秋後八月產新。

產地加工：秋後採下果實，曬乾，放簸箕內搓下子，去外皮及雜質即成。

商品規格：不分等級，以個大，飽滿，無雜淨貨為佳。

鑑別方法：全體呈三角形而不規則，一面扁平，一面凸起黑色，表面有多數皺紋，質堅，內仁白色，味甘，有韭菜味。

用 途：興奮壯陽、健胃、能制止瀉痢、多尿及遺精、治疝痛。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防潮、否則變質。

其 他：蔥子的皮光滑無紋、色灰黑、體圓形、個小、

有葱味。

鷄 內 金

別名：鷄食皮，鷄肫皮，鷄肫子。

產地：河南各地都產，鄭州為主要產地。

產季：四季皆產。

產地加工：將鷄殺死，取鷄肫，將肫剖開，將鷄肫內皮剝下，然後泡在水中，將殘余之鷄屎、砂、粒、米、谷等雜質物去之洗淨，取出攤在地上，曬干即成。

商品規格：不分等級，以色黃身干，個大完整，起紋皮薄的為佳。

鑑別方法：本品為鷄肫之內皮，為近圓形不規則囊狀或片狀物，皮內呈黃色，表面有粗皺紋，質硬而脆，極易碎，味微腥。鴨內金，皮厚顏色呈黑綠。

用途：消積食。腹脹及消化不良，及胃嘔吐痢疾等症。

包裝：箱裝或竹篋。

貯藏：防潮防霉防壓碎。

鷄 血 藤

產地：信陽專區商城，其他地區亦產。

產季：秋後產。

產地加工：將其藤割下，曬干即成。

商品規格：不分規格，以中等條身干不朽為佳。

鑑別方法：本品是苗藤，粗細不等，皮暗紅，鮮時折斷流

出血色汁液，断茬有棕黄色有暗紫色环，有虫眼，臭之无特殊味。

用 途：1、为强壮性之补血药适用于贫血性之神经麻痹症，如肢体及腰膝酸痛，麻痹不仁，又用于妇女月经不調，月经閉止等有活血鎮痛之功。

2、补气血，壮筋骨，疗手足麻木瘫痪，男子遗精，白浊，妇女經水不調，干血癆赤白帶下

包 装：席包。

貯 藏：干燥保存。

其 他：河南产的条粗，皮色和断茬顏色不太紅，切片后成紅色灰白筋。

云南产的条細，外皮和茬都发紅，切片后为紅色白筋。

鷄 冠 花

產 地：河南各地都产，均系家种。

產 季：九、十月产新。

產地加工：成熟后，把花穗剪下，搓去籽晒干。

商品規格：以大朵整齐，不发霉不带柄的为好，有紅白二种均入藥。

鑑別方法：本品以花供藥用花肥厚扁平，形状似鷄冠，有紅白二种。

野鷄冠花朵小，顏色多呈紫紅色不入藥。

用 途：多作妇科及眼科用藥，有收斂止血，止泻，清肝明目疗赤翳肿。

包 装：席包，或麻袋。

貯 藏：防潮，防虫（夏天易生虫）。

楮 实 子

别名：构树子，构桃子，楮实米。

产地：主产商丘专区，其他各地都产家种，野生均有。

产季：八、九月产新。

产地加工：果子成熟后，自然脱落或用棒打下，晒干，把子搓下，再晒干。

商品规格：不分等级，以红色无土杂为好。

鉴别方法：本品呈规则的园形果实，大小似白芥子，色红，外皮有网纹，一面有菱，内仁洁白。咬破后有香味。

用途：消水肿，壮筋骨，明目，用作强壮药。

包装：双麻袋。

贮藏：防潮。

葛 根

别名：干葛，粉干葛。

产地：太行山区，洛阳、信阳两专区为主产。其他专区也产。

产季：冬季。

产地加工：挖出根后用刀切成片，然后放于水中浸泡24小时，取出置石板上晒3—4天即可。太行山区是去皮后晒干，色白，粉气足。

商品规格：不分等级，只看颜色和粉性。以色白，粉气足为佳。

鉴别方法：本品是葛条的根切成长形的带状片，长者可达

数尺，寬 1—2 寸，順切面黃白色較粗糙有筋（纖維狀），斷面強纖維性，并有粉塵。

用 途：解肌退熱，開清止瀉，适用于消渴熱病之煩熱口渴症，傷風感冒之頭痛，發熱嘔吐症，下痢腹痛，發熱無汗。

包 裝：打捆或席包。

貯 藏：置干燥通风处，防虫。

其 他：据藥农称，采葛花的根很細，即不能采葛根入藥。用鮮貨切成飲片色最好，用劈开貨切片不好。

葛 花

產 地河南各地都产，山地較多，野生平地人工压的也有。

產 季：春秋三月。

產地加工：花开后，整个花穗摘下擄下花，晒干即成。

商品規格：不分等級，以灰白色完整的花为好，放陈后顏色就发紅，質量亦变差。

鑒別方法：本品是葛条的花供藥用，为灰白色扁长形的花朵体稍呈弯曲，下部留有四裂萼片，呈黄色。

与槐花的区别：槐花体呈圆形，色发黄。

用 途：解酒。

包 裝：麻袋。

貯 藏：干燥通风处保存。

葶 藶 子

別 名：密密蒿子。

產 地：河南各地都产，郑州是主要集散地，多生于麦

地或砂灘地，野生。

產 季：小滿后成熟採取。

產地加工：小滿以后角果成熟，連秧枝割下，晒一天，干后，角多自然裂开或者以棒槌打下种子，先过粗篩除去把，再过細罗除去土即成。

商品規格：分为甜葶苈子：味甜
苦葶苈子：味苦 二者外形完全一样，皆可

入藥。

以紅棕色，粒勻完整充實，无泥土雜質者佳。

鑑別方法：本品为独行菜的种子是长圆形，稍扁平紅棕色之小籽，（越陈越紅，鮮貨为黃紅色，）有油性，比車前子还小，亦不粘手。

用 途：祛痰止咳，利水，适用于濕性肋膜炎，肺脓肿，支气管扩张，胸腔积水小便不利面目浮肿等。

包 装：內装布外袋面装麻袋。

貯 藏：防潮（吸潮后发黑）。

蜂 蜜

別 名：蜂糖。

產 地：河南新郑产之为佳，其他地区亦产。

產 季：七月間采割。

產地加工：“本蜂”割蜜时将蜂巢割下放于布袋中，擰出的汁即为成品，其渣称蜂腊（黃腊）。

“洋蜂”（人工培养）将蜂巢取下放于攪蜂机中，将蜂取出即可。此蜂无腊。

商品規格：本品不分規格，无杂，干淨，不变質，味气长

而呈紫紅色为好。習慣認為枣花蜜最好。目前市場主要以洋蜂蜜為主，本蜂蜜也有。

鑑別方法：本品為棕紅或紫紅色半流體，甜而有香味，其優質品如枣花蜜為紅棕色，用木杆挑之有絲，油性大。

用 途：去熱、潤腸、鎮咳、通便秘、解毒、補虛。

包 裝：竹篋、鐵筒。

貯 藏：密閉、防灰塵及雨淋，夏天留出氣孔，以防發熱變質。

其 他：本蜜：味甜而長，色黃。

洋蜜：味末帶有酸味，色白。（吃到最后有酸味）。

摻假品，蜜摻中的豆面、谷子面加熱時則起厚沫。

在鑑別方面若含有雜質將燒紅之鐵絲插入蜜中，有摻假則鐵絲上沾有一些東西、好蜜則光滑（摻假品，黃豆面湯飴糖等）。

蜂 房

別 名：馬蜂窩。

產 地：各地均產、嵩縣、廬氏、內鄉等山區產量較多。

產 季：四季均產，冬季產的多。

產地加工：趁冬季雪天，蜂宿於巢內不能外出時，將蜂房取下，放火炕上，炕死幼蜂並除去死蜂死蛹，即成。

商品規格：不分等級，以色白，綿軟體輕，孔略小（俗稱細蜂房）者為佳。孔大質硬者（多產於深山）為次。

鑑別方法：本品是馬蜂的蜂房，是不規則形的偏塊狀或三到五層疊起而成，多者有十餘層相連者，蜂房是由多數整齊有序的六角形小孔（筒）組成，孔內有的帶有幼蛹，孔上有白色

膜封盖，底面呈六角形网状，有数个小突起，是附于他物之系带。

- 用途：**除风、止咳、定喘。
包装：席包或竹篾（40—50斤）
贮藏：干燥保存。
其他：以蜂蜜炙后，止喘甚效。

蜈蚣

产地：主产在信阳专区的南部山区，南阳专区亦产。

产季：主要产季为春2—3月到谷雨以前，谷雨以后到立夏采者较少。（谷雨前产的易炕干，过夏后较不易生虫，谷雨以后产的多经过交配，肚内有子不易炕干）。

产地加工：产季时期到山区，备好竹杆，带好手套，将山上石块掀起用手扑捉，扑捉后用竹竿一头插入头下，一头插入尾前，将活虫全体绷起，使它伸直，扑捉后带回家中，放平锅上加火炕死、炕干。炕时蜈蚣受热后将足紧抱于竹杆上。干后再将10个或5个一组，一排排夹于竹片上，或捆成小把即成。

商品规格：以个大不生虫，头足完整的新货为好。一般分为：

把货：一把50条捆成小把（过去多是不足数）

排货：5个或10个一组，10或5组成一排，用竹片夹起，排货数足，易于看清大小好坏，此货为佳。

鉴别方法：蜈蚣是节足动物，体长约4—5寸，头红色，由两节组成，头前有须及钳各一对，体腹背面黑色，由20节组成（其中最末一节为尾），全体有足20对（尾节无足，但头部

第二节有足一对)黄色,多抱于腹面插入的竹杆上,有特异嗅气有毒。河南产品:条稍小,体腹背面呈黑色。

苏州产品:条大者面微发红。

本品与蚰蜒的区别:蚰蜒体小,腹与足均是黑色。

用途:解毒、治惊风、瘰疬、秃疮、丹毒等症,与全虫并用可防脑炎。

包装:纸包(一把一包,十排一包)而后装木箱,内衬油纸。

贮藏:防潮(见潮生虫)防鼠咬,夏日最易生虫。

路 路 通

别名:狼眼,鬼鼓狼眼。

产地:信阳专区,南阳专区、野生。

产季:7—8月收集。

产地加工:成熟时自然脱落,拾起后即成,或用竹竿从榿香树上打落,去泥土,去把、晒干则可。

商品规格:本品不分等级,以身干无泥,无把(即果柄)为好,以不霉不腐不发白为好。

鉴别方法:路路通,外形似美人脱衣,为枫树之果,宽约5—9分,球形干燥果实,表面多刺,除去刺则显较多小孔(为种子脱落)故名路路通,有一小果柄,果外表灰棕色,布满许多小孔,钝刺易拔除,除去后,即成一小孔。

用途:镇痛药,适用于遍身痹痛,经络拘挛,腰痛四肢痛等。

包装:席包或竹篾。

贮藏:发霉后发白色不能入药。干燥防霉保存。

葱 籽

產地：河南各地均產。

產季：每年二月間將去年的蔥下種小滿前後採集。

產地加工：將枯老的蔥棵，從土中挖出，切去帶子的果，多的時候用石滾碾、少時用棒棍錘打，然後簸去皮和雜質即成。

商品規格：不分等級，以飽滿，色黑；無土及雜質為佳。

鑑別方法：黑色體呈三稜形，皮光滑，無皺紋，咀嚼後，有蔥味。（與韭子相似，但韭子皮有皺紋，稜形較小。）

用途：止蟲牙痛，固腎。

包裝：布袋。

貯藏：乾燥防蟲貯存。

薦 蓄

別名：豬牙草。

產地：河南各地都產，野生。

產季：秋季八、九月產。

產地加工：連根拔起或以小鏟鏟起曬干後及剪去根捆成小把，即為成品。

商品規格：以灰綠色，無老根及雜質，乾燥者佳。

鑑別方法：本品是蔓生的草，莖多，枝有節，粗細半分到一分，節長約三分到一寸，節上有白茸毛狀物，莖上有順走的條紋，空心，呈綠色。

用途：利水、消炎、止瀉驅蟲，治黃疸等症。

包裝：席包。

貯藏：防潮。乾燥貯存。

硼 砂

別名：月石。

產地：河南不产硼砂料子，只是从料子加工成月石。

產季：四季都可制做。

產地加工：鍋內放水，水量約能將所下料子全部复盖即成，加热使水微沸，加入硼砂料子，繼續加热，到全部料子化成水后倒入缸中。缸上放橫棍，棍上系数条麻繩下墜一鉄釘垂于缸內，放冷后即有成串的大块結晶生于麻繩上而成为月石墜。缸底也生出大块月石。將有成結晶的水倒出留做下次再用，取出月石，放干即成。

商品規格：以青白色发亮的結晶块为好。一般分为月石墜与月石块。以墜为最好，（色青白无杂）有粉性，色发烏的为次。

鑑別方法：月石墜是成串的青白色結晶体，长约一尺，粗約一寸許，通体是由大块金鋼石状晶块組成，上部露一麻繩，下部有时可露出一鉄釘尖，月石块大小块都有顏色为青白稍发暗。

偽品：过去有用白矾伪造的，此偽品稍不透明加高热后变成粉为枯矾，月石受热后变黏不成粉。

用途：主治鼻血不止，上焦痰热，咽喉肿痛 噎 呕 反胃。

包裝：箱装，每箱中装月石墜約为 $1/10$ ，其他为月石块。

貯藏：严防受风，見风后，变成粉状色发烏。易风化。

远 志

別 名：茶棵（偃师）

產 地：洛阳专区灵宝为主产，产品好，黄河南岸芒山岭产品也好，其他地区亦产。

產 季：四季均产以秋冬产者为好。

產地加工：加工方法有以下两种：

①挖出后放置二、三天，皮皺縮、柔軟、然后抽心晒干。（因放置時間过长或新鮮的抽骨都不容易。）

②挖出后晒热趁热放濕地上用麻袋盖之过24小时取出抽骨（一次不能取多，因风吹干燥不易抽骨）

商品規格：以貨条整齐、干淨、不碎、不霉、皮細、色黄、肉厚为佳，一般分：志筒王一有笔杆粗、条长、較直、肉厚。

大志筒一粗二分許，条长、不甚弯曲。

中志筒一粗約1.5分許。

小志筒一粗約1分許。

中志筒一粗約一分以下，弯曲不直。

志 骨一不抽心的。

鑑別方法：本品为远志的地下部份体呈园柱形略弯曲，外表显浅、土黄色，粗糙，有支根的疤痕，并有深陷的橫皺紋，皮部頗厚，質脆，易折断，味香。

包 裝：出口用木箱，里面垫油紙防止損失，下面垫油紙防止潮濕，（30斤上下。）內銷用席包（100斤上下）。

用 途：养神，补心，治心血不足，失眠。为强状剂。

貯 藏：不要生霉，应放置干燥的地方，存放时不要大

批堆压，应分包放置，堆放时可在各包中插入竹批通气防烂，防霉防压。

其 他：①远志苗叫“小草”也入药。多销上海。

②正、二月盛产，发苗以前秋后也有采者，产品佳量少，多生于山地路崖边，春末夏初产者不易抽骨。

酸 棗 仁

別 名：枣仁、奎枣仁（新乡专区）。

產 地：主产开封专区，密县，滎阳，产量大，質佳。新乡专区济源、延津、輝县，洛阳专区宜阳、偃师、卢氏、灵宝，許昌专区、魯山、宝丰襄县也产，野生。

產 季：七、八月間采（霜降前后）。

產地加工：酸枣仁成熟时将果实打下，收集后按以下三种方法进行加工。

一收集的酸枣，堆成堆，加一点水使酸枣肉腐烂，摊开晒干，揚去外皮，然后将核于碾上碾碎取出置于水中漂去枣壳、枣皮后，取枣仁晒干即成。

二、收集的酸枣，放于碾上先碾成糊状物、取下晒干，而后再碾碎枣核置水中漂取枣壳枣皮，取枣仁晒干即成。

三、酸枣仁成熟时，将果实打下。堆放几天，然后放在缸里。用水浸泡半天，以竹扫帚把枣皮和肉撞去。傾取底部的核，趁濕放在磨上（磨臍用銅錢垫起）。把枣核壳磨碎后，置水中，漂去枣壳及枣皮，取枣仁晒干即成。

商品規格：不分等級。只分、毛、淨貨。

毛貨帶有部分核皮。淨貨无核皮（习惯称 90% 以上的仁即称为淨貨）。色紅飽滿微帶黃色，片大不碎无核皮，質最佳

(为密县产的。)

色黑紅，片小，多为毛貨。質量較差。

鑑別方法：本品以成熟种仁供藥用：其仁外皮呈紫紅、光亮、內仁黃色、有油性、无味。

用 途：养神、安眠、治心血不足、熟的治失眠，生的治睡症。

包 装：用双麻袋。

貯 藏：不碎不生虫，碎貨易生虫发霉，应放于干燥通风处保存。

漏 蘆

別 名：龙葱根，漏蘆棍。漏蘆葱（許昌专区）。

產 地：主产于信阳、新乡专区、許昌专区魯山县、洛阳专区嵩县。

產 季：秋末冬初。

產地加工：挖出后把苗去掉晒干即可。

商品規格：不分等級，个大肥胖，不枯老为佳。外皮黑而生霉者为次。

鑑別方法：漏蘆藥用其底下部分(根及根茎)呈园錐状，头粗尾細，有点弯曲长约8寸至尺余，一般为3—6寸长，外皮呈黑黄色，其上端有蘆头，蘆头上生有棕灰色长針状毛茸，长短不齐，头部有时有扭曲状凹紋。断茬(断面)：外层灰白色，內层则为黑黄白交錯的花紋，断面不光滑，有很多筋，味微苦而辣粉末强烈催嚏性。

用 途：治恶瘡疽痔，皮肤热毒，諸瘡通风，打跌伤，能排脓止血，通乳，驅蛔虫。

包 裝: 席包。

貯 藏: 防腐 (一般不易生虫)。防潮。

其 他: 与年健 (千年健) 之区别: 千年健其外形与此相似, 但其断茬为紫紅色, 有筋 (纖維) 有很多硬刺毛, 但头上沒有毛, 質坚硬。

蒼 朮

產 地: 桐柏山区 (桐柏、泌阳) 为主产, 除商丘专区以外其他各地都产, 以南阳专区产量最大。

產 季: 秋后冬初。

產地加工: 挖起后半晒干, 堆放地上, 平鋪, 以柴火燎之, 烧去毛 (須根) 然后再晒干。撞去黑土即可。

商品規格: 不分等級, 以身干, 个大肥滿, 干燥为佳。

鑑別方法: 本品是蒼朮根基为不規則圓球形的疙瘩, 体形如姜, 表皮土褐色, 断面粉白, 带珠砂点, 气清香, 味辣 (茅朮)。表面黑褐色断面黄色有筋 (纖維) 无或少紅点者为黄蒼朮。

用 途: ①强壮剂补养藥②健脾燥濕适应于胃脾虛的而多濕者。

包 裝: 席包。

貯 藏: 防潮, 置于干燥处。

其 他: 蒼朮色棕黑, 体較泡, 又称黄蒼朮。毛蒼朮 (茅朮) 形与蒼朮相似, 外部有毛 (須根), 切片后生白霜 (是一种有效成份的結晶—蒼朮醇), 味也相似, 色黑黄, 茅朮質量好价高, 但产量銷量均少, 易生毛, 冬季也长。

蒼耳子

別名：刺几棵，羊屎蛋棵。

產地：河南各地都產。

產季：秋季八、九月產新。

產地加工：果實成熟時用刀割下秧棵，曬干打下子，或直接用手擄下籽，放置在簸箕中或光地上以手穿鞋，搓去刺即為成品。

商品規格：不分等級，以個大、無刺、色黃飽滿的為好。

鑑別方法：本品以蒼耳的果實入藥，全體呈橢圓形二端尖全身生硬鉤刺，外皮為灰綠色或土黃色，破裂後內有種子。

用途：發汗利尿，敗毒有鎮痙鎮痛之功。現也為油料。

包裝：麻袋。

貯藏：防潮。

槐角

別名：槐豆，槐連燈，九連燈，天豆。

產地：河南各地都有。

產季：冬至以後。

產地加工：一般多在農曆臘月，槐角在樹上自然干燥時採摘，用竹杆將槐角打落後繼續涼曬，並除淨雜質即成（入藥前再蒸）。

商品規格：以肥大、角長、不霉、無蟲為好。

鑑別方法：本品是槐樹的果實彎曲的長角果，形似黃豆角呈連球狀，長約1~3寸，多由2~6豆組成，外皮棕褐色，

表面皺縮，果实有一黃白帶子生于一側，果皮味苦，內包黑色槐豆似黑豆，稍圓，內仁黃綠色。角蒸前味苦，蒸后即不苦、顏色亦變黑。

用 途：清大腸火，潤腸，治痔瘡。

包 裝：麻袋席包均可。

貯 藏：防潮防虫。

槐 花 (附槐米)

別 名：本地槐樹花，落地槐。

產 地：密縣、新城、鄭州產之，其他地區亦產。

產 季：七、八月間採摘。

產地加工：槐米：將布鋪在樹下面，用木棒打掉槐米，收集曬干后除淨雜質即成。

槐花：採摘前將樹之周圍掃淨，待花落於地面后，即時將收起，除去雜質曬干。

商品規格：槐米：以綠色之花蕾，整齊，無雜質者佳，有散花片或色澤發黑，有雜質者次之。

槐花：以黃色，整齊，無雜質為佳，散片較多，色澤發白者次之。

鑑別方法：槐米：為未開放的花蕾，黃綠色，長橢圓形，上端狹小。長約2分左右，粗約1分許。槐花：為初開放的蝶形花，黃色，帶有綠色花萼。

用 途：槐米：提取盧丁治高血壓，工業上用作染料。槐花：治小腸熱、敗毒。皆為清涼性，收斂，止血藥。

包 裝：用麻袋包裝。

貯藏：易发霉生虫，藏于干燥通风处保管。

蒲 公 英

别名：黄黄苗。随风飘。

产地：河南各地均产。野生。

产季：春季三、四月开花。麦前（割麦前）出新。

产地加工：挖取带根、苗、花的全植物，晒干，去土杂即成。

商品规格：不分等级，以根小带花叶，色青绿，整齐不霉烂，干净无杂为好。

鉴别方法：本品以蒲公英的全植物入药，叶长4~5寸，边有锯齿，花黄色，有毛，味苦。

用途：清热解毒。解热，发汗，健胃，强壮药。

包装：席包。

贮藏：防潮，发霉变质。

蒲 黄

产地：主产于郑州和商丘专区。

产季：秋季。

产地加工：生于池塘河坡，春季从老根发芽，夏季长圆苔，顶上开长穗状花，如蠟烛，谓之蒲黄，花粉黄褐色，四月采取花粉用筛子筛去杂质，得细粉，晒干即成。

商品规格：不分等级，以粉细黄色，手捻之不顶手不带砂，无杂质净粉为好货，若带黑点为粗货。

鉴别方法：是鲜黄色细粉质轻，置纸上研磨后看不出毛茸

样物，入口发甜。

假品：是由青竹杆打成粉加入2%的姜黄而成，色与真品相似，入口后不发甜，微带姜黄味（也有用此货假充姜黄粉）。

用 途：生用破血，消肿，炒用破血，止血。

包 装：布袋。

貯 藏：防潮，防雨（受潮发黑成块）。

篋 麻 子

别 名：大麻子。

产 地：以郑州、太康、禹县为主产地，其他地区亦都产，均系家种。

产地加工：秋后待果实成熟时摘下，晒干后即自行脱落。簸净即为成品。

商品规格：以籽大，饱满，无杂质的为佳。

鉴别方法：本品为扁椭圆形，种皮光滑为红褐色呈微红之斑纹肉白，种仁富有油性。

用 途：下泻药，多用榨油。

包 装：麻袋。

貯 藏：防潮，置干燥通风处。

墓 头 回

别 名：老婆子臭脚根。

产 地：河南各地均产，多野生于山地，坟地。

产 季：冬春季产，冬季产品较好。

产地加工：挖出后去苗秧晒干即成。

商品規格：本品不分等級，以肥胖飽滿，條粗色棕黑為佳。

鑑別方法：本品是地下部分入藥，外觀為不規則的根，狀似朽木，體面有深淺不一的紋，且有時向一個方向扭曲，外皮呈棕黑色，很易剝落，斷茬為淡黃色或土黃色，有車輪狀環（即輻射狀），質地較硬，性脆，有特殊臭味（臭很強烈）很似與顏草臭，也似臭膠。

用 途：外用洗腳，治腳痛。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮易生蟲，當年貨當年用。

豨 薟 草

別 名：豨仙草。

產 地：主產於商丘專區。

產 季：秋後產。

產地加工：割下後打成捆曬乾。

商品規格：以嫩枝葉整齊，青綠色，不帶根，不變質的為好。

鑑別方法：呈青綠色，莖呈類圓形其上有凸起的6—8菱條紋空心。

用 途：①治風氣，疔筋骨疼痛，四肢麻痺，可實用於風濕性關節及神經痛等症。②用干補藥有安五臟，除肝腎風氣之療效，③外用以除諸惡瘡及蟲咬傷，風濕瘡瘍。

包 裝：席包。

貯 藏：防潮防霉。

銅 綠

產地：各地均产（目前市場銷的是天津出品）。

產季：常年产之。

產地加工：將銅塊，用醋洗后，放入磁罐內埋入地下，过2~3月后挖出，銅上即生一层綠色锈，刷下成綠色粉末即为成品。天津所产加工不詳但市場只有此品。

商品規格：不分等級，色綠，淨者佳。

鑑別方法：本品大多自制，綠黑色粉末，放于水中，銅綠沉底，但水不变色，見醋即化。（溶解）

用途：常用外敷，罕作內服，主治烂眼及疔疮。

包裝：箱裝。

貯藏：密閉保存。

其他 (1) 有毒。

(2) 目前市場多出售一种人工制造的商品，是以滑石粉为胎作成小长方塊，頂面有綠色的斑点，据言也可用于外科。

刘 寄 奴

别名：山藍麻索（南阳专区）

產地：洛阳专区的卢氏、嵩县，南阳专区、內乡等地，野生。

產季：秋后七、八月。

產地加工：割取全草晒干，防止雨淋、潮濕，以免变质。

商品規格：不分等級，以色青黃，枝叶整齐，不帶根，无杂质而純干者佳。

鑑別方法：本品是刘寄奴的地上部分，茎高二尺少有分

枝，上帶多數果實（長形），果內有多數微小種子（比車前小得多）種子呈尖圓形。

用 途：通經治血，瘀散結，適用於產後血氣脹痛及跌打損傷瘀血，唾痛，出血性下痢，腸出血，尿血等症。

包 裝：打捆或席包。

貯 藏：防潮。防雨淋。

十五 划

銀 花

別 名：二花、金銀花、密二花（密縣產）、山二花（南陽產），忍冬花。

產 地：開封專區的密縣為主產（密縣五指嶺產的最好）尉氏縣、滎陽、登封、許昌專區鄆陵。南陽亦產。

產 季：麥收前後（五月份）。

產地加工：選擇好天，起五更時去採（此時花不開放），摘下後鋪於青石上，一次曬干，不翻動，不能見水，否則變黑，曬時也不要太薄，怕曬糊，曬干後用布（新布）包起來，密閉防潮，見潮後顏色立即變黑（曝曬也易黑）。

在陰天時摘下，可放竹筴上，不動涼干也可以，但質量沒有日曬的好。

商品規格：以條長、細硬、不開花的為好。

鑑別方法：本品藥用其干燥花冠黃白色，長約7—8分或寸許，花冠內含有細長之雌蕊一枚及雄蕊五枚，下有微小的子房存

留，气味芳香。密县西山貨：条細、色气好、握之頂手。

密县东山貨：花大、質泡、条粗、不頂手。

南阳貨：有开花的，也有带叶子。

山东产品：黄条多带叶，叶子大，質量很泡，手握之似握生面条。

用 途：瘦疮瘍，利尿介热杀菌治疮节。

包 装：新布包（50~60斤）（主要是新布能防潮）。

外銷：小箱（20~30斤）內襯油紙，上料猪血加石灰防潮。

貯 藏：防潮，見潮后变軟发黑，貯存在高处最好。

其 他：一等，尖子銀花，主产密县西山，条細、有骨气，无油条（发黑的）黑的，无黄条。

二等，少带些油条和黄条，沒有开花的。

三等，带有較多的油条和黄条，沒有开花的。

四等，黑花（油条）。

五等，是已經开花的，又称为“鑲子”。

現在銷售分一、二、三叁級及等外四个規格。

銀 杏 叶

別 名：白果叶。

產 地：主产于信阳专区，其他各地亦产。

產 季：秋后。

產地加工：收白果时，摘下叶晒干即成。

商品規格：不分等級，以叶肉厚色黄綠的为佳。

鑑別方法：本品为白果的叶，有細长的柄，叶面呈扇形，叶脈平形，邊緣略厚，常二浅裂，色黄綠色。

用 途：驅虫。

貯 藏：放乾燥处。

蓮 子

別 名：蓮蓬子、湖蓮米。

產 地：河南各地都產，信陽產量大。

產 季：八、九月採集。

產地加工：秋後剪下蓮蓬，取出蓮子，黑色似石蓮子，曬干，置石地上，圍以指頭粗的繩（同杏仁加工法），以石板等榨破外部黑皮取出蓮子再曬干即成。

商品規格：以個大飽滿不抽皺，肉色紅，不破頭不碎，不爛為好。

鑑別方法：本品為小長卵圓形或橢圓形的果實，外皮微紅色的種仁內白，中間有綠色的心，味苦。

用 途：滋補強壯藥。

包 裝：麻袋。

貯 藏：防潮，防蟲，夏日伏天最易生蟲，置放硫黃炕房中。

其 他：①一般藥店只售湖蓮子（俗稱蓮子、產湖南）建蓮與湘蓮食品店出售。

②河南產品色粉紅，比湖南產品個稍大。建蓮子產福建，個大，色發白（粉白色）有河南產的一個半大，身上帶皺紋以不發澀為最佳，湘蓮子，產湖南，個大、圓形，紅白色（比河南產品色淡）入口不澀。

蓮 房

別 名：蓮蓬。

產地：河南各地都产，（生于水中）

產季：秋后九、十月。

產地加工：秋季蓮子成熟后，将池水放干，剪下蓮蓬，取出蓮子，将蓮蓬晒干即成。

商品規格：不分等級，以色青綠，个大整齐不破碎的为好，放过夏后变为紫色。

鑑別方法：本品是半球形的花托（蓮蓬），上面有多数取出蓮子后的园孔，下部有残存的果柄，紫褐色，味苦涩。河南产品个小（直徑2寸以下），新品青綠色，放年久后变为黑紫色，一样入藥。

用途：生用止帶，炒黑止血。

包裝：竹篾、席包均可。

貯藏：防潮。

蔓 荆 子

別名：京子。

產地：主产在南阳专区各县。野生。

產季：秋后产新。

產地加工：果实成熟后連秧割下，打下子或用手擻下，除去枝叶及杂质，晒干即成。

商品規格：不分等級，以个大带帽（残萼）色灰黑的为好。

鑑別方法：本品是黑色球形果实，四周有四条凹綫，上部带灰色帽（2~3片残萼）及一小把（果柄）体輕質干，有特异香气，味微辛辣。

用途：驅风、清凉性鎮靜藥，并有强壮作用。

包裝：席包。

貯藏：放干燥处。

其他：山东产品个小，带帽。河南产品，个大，不带帽。色黑。

磁石

别名：活磁石，吸铁石。

产地：主产于新乡专区。

产季：四季都产。

产地加工：开矿时采之。

商品规格：分二种，活磁石和死磁石二种。

鉴别方法：形状似生铁块，色乌黑，断面呈黑褐色，并带有显亮光的灰点，活的能吸铁，断开新茬后放在地上一、二天后即生出黑亮的毛茸（铁粉），死磁石不能吸铁，铁茬不如活磁石光亮。

用途：镇痉、降血。

包装：麻袋。

贮藏：为保持活磁石的活性，常与锉刀锉下铁粉，放于一起。

十六划

泽兰

别名：泽兰叶。

产地：主产信阳，商丘两专区，洛阳、新乡专区亦产。

产季：秋后。

產地加工：割下地上部分晒干，打捆即成。

商品規格：以色黃綠，完整，帶葉，無雜為好，發霉變黑為次。

鑑別方法：澤蘭（地上莖、葉花入藥）全長約為2~3尺方杆（俗稱芝麻杆），空心（頂端嫩者則實心）全草干後，葉色枯黃莖深棕色，節為黑棕色，不易折斷。葉生於節上，花鮮時為藍色，似益母草花，環生於莖上，莖直立多不分叉，葉長形（披針狀）約1~2寸，多已皺縮，邊上有尖刺（鋸齒緣）臭有淡香。

用 途：主要功效為補血和血，適用於胎前產後的疾患及跌撲損傷用之活血散郁之功。以其芳香辛散，能醒脾舒肝氣郁不舒者服之。

包 裝：席包。

貯 藏：防雨，見雨發霉不能入藥。

十七 划

薄 荷

產 地：主產許昌專區的長葛，禹縣其他各地均產。

產 季：五、七月間開花前採。

產地加工：分：頭茬（老葉）五月採，氣味長，葉厚大，二寸長、一寸寬，色發青綠；二茬六月採，葉稍小，味稍差；三茬八月採，色氣好，捆成小把晒干，稱涼薄荷。離地寸許，割下後，排齊打成小把晒至半干（晴天割下一次晒至約八成。

干)，待日落后微潮时运回，然后把叶排放在板上，使根头向外，压干，由上往下摺即为净叶。另外在接近泥土部份，用刀锄去约三寸，其上面部份切成小段即为毛货。

商品规格：分：净叶，全部是叶子。杂货：（毛货）有叶及茎杆。

鉴别方法：茎为四稜形，中空，紫杆，叶青绿色，有辛凉之香气。

头茬：杆粗（一分许），高一尺多，叶大而厚。

二茬：少带花，杆稍细，高约一尺左右，叶稍瘦。

三茬：叶绿、杆细约（半分），叶最小。

用途：健胃，驱风、发汗。清热，用于伤风感冒头痛、目赤及热病初起，身热无汗，喉痛等症。

包装：先喷洒上水，使吸潮后，再打包。席包、方包、三角包（60~70斤上下）。

贮藏：防雨淋、防潮、不使变色变质。

薏 苡 仁

别名：薏米、玉米、薏仁米。

产地：主产许昌专区的西华，商水，新乡专区博爱，武陟，也大量生产。

产季：九月采。

产地加工：割下后放置晒干，把籽打下，用碾先把坚硬光滑灰色的外皮碾去，碾时掺上麦杆或麸子，把外壳除去后，得到坚硬黄色的米仁，然后再上碾，把黄色很薄的内皮除去即成。

商品规格：以籽大，不碎，白色整粒充实无破碎，无糠皮，无虫蛀及沟中不发黑为好。一般分为：

薏米：很少有碎粒。

碎薏米：碎貨占一半以上。

鑑別方法：本品为椭圆形，比綠豆大些，侧面有一条横溝，外面黄褐色，内面白色粉状，味微甘。

用 途：健脾，渗湿。

包 装：双麻袋。

貯 藏：防虫过夏最易生虫，带外壳的可放很久，成米仁后易生虫。

其 他：福建产的个大，丰肥。

龍 骨

產 地：河南各地均产，以洛阳、西峡、卢氏。灵宝产的多。

產 季：无一定产期。

產地加工：龙骨是埋藏于地下的大动物化石，多于修造大型建筑工程中，挖掘出土而得。一經发现，往往不是一两块，多是大半个，或全个动物的化石，挖出見风吹干多成碎块，因此多于挖起后用毛边紙，将龙骨糊起，只露出一两块，花色較好的表面以作鑑別品質优劣。

商品規格：以質輕見风变酥，摸之落粉，并带有紅、白、兰、黄、黑，五种顏色花的紋为好（俗称五花龙骨）佳品体輕，吸舌性（吸水性）非常强。質坚体重，白色不带花紋不易碎的为次品。

鑑別方法：本品多是不規則型体的化石。体形不大小不一，很似石块，但質輕不打手不重，也有不用紙糊起的龙骨，若是已长成的龙骨，多成碎块，往往为厚的圓筒形片状物（大块龙

骨多分很多层如大树的年輪)也有五花。如果未成熟的龙骨不易破碎,稍質重,花色也不好。

偽品:有用鱗骨(也是一种大动物化石但与龙骨不同)的充龙骨用,鱗骨,質重色灰黃,不分层,中間有多數毛孔(似一般兽骨之毛孔)有的中間是空洞,边有花紋,但顏色很淡不明显,吸舌性不如龙骨强。

用途:歛心神,固精、燥濕强力止血藥(甚效)。

包装:木箱。

貯藏:严防受潮,受风吹見潮見风变碎。(风化)。

其他:露出的表面多現紅、黃、兰、白、黑各色,很象远看的山水画面(国画)。此表面以舌試之,吸舌力很强。

龍 齒

产地:各地均产,以洛阳、西峽、卢氏、灵宝产得多。

产季:无一定产期。

产地加工:采得过程同龙骨,但采得后不用毛边紙糊起,去淨泥土即成。

商品規格:分为一般的龙齿与青齿两种規格,以青齿为最好。

鑑別方法:龙齿是古代大动物的齿骨化石。青齿多是长方形的齿化石,大小不一,大者长可达数寸,寬約寸許,小的也有长1—2寸的,青齿均为青黑色或黑褐色,光滑发亮,質堅体重,表面无吸舌性質,断面有吸舌性(吸水性)。一般的龙齿,体形各异大小不等,大者长約9—7寸,寬約4—5寸,小者也有1—2寸的,齿形有似象牙的,也有似青齿的,还有其他各种形状,有牙白、灰白、及紅白各种顏色。灰白色的表

面粗糙不光滑，牙白色及紅白色的表面光滑 尙存有瑣瑣質殘痕。斷茬仍有吸舌性質。

用 途：固精、燥濕、止血。

包 裝：箱裝。

貯 藏：同龍骨。

十八划

瞿 麥

別 名：石竹。

產 地：禹縣、長葛、西平、遂平，家種。

產 季：麥收後出新。

產地加工：瞿麥入藥為地上部分，五月間割下，曬干打成小把裝席包內即可。

商品規格：不分等級，以色青黃，花未全開，不帶根，不霉無雜為好。

鑑別方法：本品為多年生草本植物，莖長約6寸~1尺左右，干的呈青黃色或黃色，莖中空，有小孔，莖上多生節，葉生于節上（葉基包莖），對生，狀似麥葉（花開時似小喇叭），干後結穗生于頂端，好似麥穗，多3~5聚生，河南產的基部帶有部分根的也不少見。

用 途：利尿、涼血，為治淋要藥。適用於尿道炎、淋病，尿血，小便時莖中痛，并可治月經困難。

包 裝：席包，小枕頭捆。

貯 藏：防潮。

翻 白 草

產 地：各地都产，野生。

產 季：春季及麦收前产。

產地加工：采集后，晒干即成。

商品規格：不分等級，以无土无杂质带根少的为好。

鑑別方法：叶根生，呈羽状，上面綠色或浓綠色无毛，背面密生白棉毛。下部少带根。

用 途：止血，治瘡疾，現有用作治痢疾。

包 装：席包。

貯 藏：防潮。

蟬 衣

別 名：虫脫，麻儿鳥皮，雷振子。

產 地：主产于中牟、尉氏、新郑其他各地亦有产，以商丘专区的馬收集产的为最好，多生于柳树上。

產 季：5月产。

產地加工：从树上取下，或在地上拾起即成。

商品規格：以茶褐色个整齐无泥土，俗称(灯笼貨)的为佳。在过去有掺沙土的称为(墮子貨)，另有一种小虫脫，外形与蟬蛻完全一样，亦同样入藥。

鑑別方法：本品系蟬所蛻的壳皮。

用 途：①退热鎮靜，用于治小孩惊风发热，抽搐癱瘓口禁失音。②能治肝經风热。

包 装：席包，出口的用木箱装。

貯 藏：防水，防潮。

鵝不食草

產地：主产于新乡，多生于水池边。

產季：秋冬二季产。

產地加工：割下后，晒干装箕即成。

商品規格：不分規格，以秧粗叶多，气味大(刺鼻味)者为佳。

鑑別方法：是带根小草，全秧长4—5寸，枝叶细小黄绿色，上部有时带有黄色小球形果实，似小米粒大小，市售的商品多团成乱草形，有刺鼻臭气，吸后打喷嚏。

用途：通七窍(配红灵丹等用)。

包裝：麻袋包。

貯藏：防潮，吃潮后，味短，质变次。

十九划

藜 蘆

產地：主产于伏牛山区、嵩县，其他各山区都产。野生。

產季：霜降后。

產地加工：挖出后，去上部苗叶切取下部茎(约2—3寸长)晒干即成。

商品規格：不分等级，以净货无土为佳。

鑑別方法：本品以全草(不带根)入药，茎似葱，外边带棕黑色纤维样物。吸入细粉后打喷嚏有剧毒。

用途：倒痰，杀虫药。

包裝：席包。

貯 藏：防雨。

二 十 一 划

麝 香

別 名：元寸，獐子臍，香獐子。

產 地：南阳专区淅川、新乡专区济源而以卢氏、嵩县貨色好。

產 季：四季皆产，但貨色不同。

產地加工：捕捉方法：(1) 枪打（此法冬天为主）(2) 繩捕捉（此法夏天为主）。当麝被打死或捉到之后，用刀割下囊状物削去硬皮及杂肉，只留薄膜皮和部分外皮然后放于身上暖干即可。

注：加工方法不一，依当地习惯而决定。

商品規格：現在市場上不分等級，但以过去經驗有以下几点作認識貨色的好坏参考。

味浓，色重（呈酱紫色），出子多，有油水为佳——其原因有二种，說法其(1)認為此貨为老或壯年麝取下。其(2)秋貨因草壯，阳光强。

味短，色輕呈酱黄色，子少，油水少則次——原因其(1)認為此貨年幼麝所出，其(2)認為春貨吃嫩草，即阳光弱所致。

鑑別方法：本品为麝（雄的）阴茎与肚臍間包有芳香物質的囊状物，其形状不一，外觀为大扁园形，或呈卵园形，带有蒼白色稀毛，摸之发硬，也有带有部分硬皮和干癩的残肉，（外面沒有硬皮的商品称为銀皮），一端有小园口，有部分麝香

露出嗅之有浓烈香气微带骚气，用手握之体較重的則其內含麝香子多而好。切开則可見有园形或扁园形的子，大的約似指头肚，小的如綠豆并有部分粉末其色为枣肉色（即紅枣去皮后之色）或酱紫色，也有无子全为粉末，一般子少則貨泡些在中藥界中認為“当門子”（即大子）最好。

鑑別經驗：

(1) 用舌头試取很少一点放于舌头上則鑽舌头（即舌尖有針刺感）假貨則无。

(2) 放于手心沾唾液少許以指头研之，最后都能均勻的分散而不結成一个珠則为佳品，但一般很少，假品或掺假太多則研之成珠。

(3) 点燃之香（或香烟），取麝香少許放于其上，則发出的烟成一直綫（真品燃之則发泡即沸騰状）。伪品或次品（掺假品）則发之烟多散开而不成綫。

(4) 用手捻之成卷，手放开則立即弹开，捻几次都有此現象，即在用手压之变形，压力去后則立刻复原。

(5) 若其品掺有麝香外皮，可取油布（油綢）磨擦，几次則皮即磨出。

(6) 用探子（有溝的鉄針），自整个麝香的下半部份刺入，拉出之后初其面很平，傾刻发凸起，若掺假多則凸起困难。

(7) 一般帶有残肉及毛的多为真品，但应仔細注意也有假品为人工做的，主要应把其上层皮掀开看。

用 途：兴奋藥，神經强壮藥，鎮痙藥。

主要功效：(1) 为辛溫香窜之品，故能舒通經絡，开窍透肌，可用于中风中气，中氮等急症。

(2) 一般急性热病，呈現神志昏迷时，可以于丸散藥中用之开心窍。

(3) 跌扑損伤，痙痲，心腹暴痛，外用于消痈疽疮肿等症。

包裝:原貨不动,裝于瓷瓶中密封保存,防止氣味外逸。

貯藏:裝入瓷瓶塞好塞子包以軟羊皮,再用布包上。

或裝入玻璃中封好,放入水中保存(即水封法)

其他:(1)漢中出品最好,氣味長,色氣足,青海貨最多,河南大別山區亦好但貨少。

(2)有一種用手握之發軟似一包漿糊,此種為水麝香,質量很好,并非假品。

(3)過去摻假的麝香,可能有以下幾種物質:1、鎮陽、兒茶(加入此偽品會發)。2、鷄蛋黃(在銅勺中炒黑因用其油)3、摻鋸末(四川有此品)一放于口中嚼之最後有渣子,味也咸。4、摻牛羊肝(甘肅有此品)一有濃騷味。5、做偽品用鷄胃作包皮,用澤瀉處理。

鶴 虱

產地:主產在洛陽專區,嵩縣、洛寧、魯山、內鄉等地為野生。

產季:霜降後(八——十月)

產地加工:果實,成熟後,連花頭摘下,曬干,搓出籽,去皮即成。

商品規格:以成熟,飽滿紅黃色淨貨無毛皮的為好,有白皮的為毛貨。

鑑別方法:為長形果實,有小果柄,黃綠色,或黃褐色。表面有楞,邊緣生有鈎毛,質輕,有香氣。

用途:腸寄生蟲病驅蟲病,并能治腹痛。

包裝:布袋。

貯藏:放干燥通风处。

二十二划

蚕 沙

別 名：蚕屎。

產 地：各地都产，南召、密县、禹县主产。

產 季：四月产新，（蚕长大后将成茧时产新。）

產地加工：蚕沙是蚕的粪，当蚕长大在产茧的前二、三天时即开始便黑的粪，据讲三、二日内，便完比种黑粪后即开始吐丝，于此期间收集黑色蚕粪，即为成品。

商品规格：不分等级，以黑色，个完整的净货，为好。

鑑別方法：是长柱状小粒，从圆柱的一头看去，是由六条菱线集于一起所成。每一条菱线，又由多数小段而成，所以通体，好像由多数长方形小块排列而成，质坚硬不易碎，多为黑色，少有发灰色的。

用 途：却风湿，化痰血，熬水后洗风疹甚效。

包 装：布袋。

貯 藏：干燥保存。

藥用部份索引

种子与果实

山萘萸.....(14)	萊菔子.....(158)
山查.....(13)	楮实子.....(175)
扁豆.....(116)	葶苈子.....(176)
柏子仁.....(103)	槐角.....(187)
連翹.....(137)	故子 (补骨脂)(104)
酸枣仁.....(184)	千金子.....(8)
薏苡仁.....(199)	大枣.....(5)
五味子.....(21)	芡实.....(97)
王不留行.....(36)	蒼耳子.....(187)
冬瓜子.....(51)	韭菜子.....(172)
白芥子.....(42)	牛蒡子.....(36)
白果.....(43)	青箱子.....(86)
白蒺藜.....(44)	火麻仁.....(38)
地肤子.....(66)	蔓荆子.....(196)
决明子.....(73)	急性子.....(114)
車前子.....(72)	梭罗子.....(154)
苦杏仁.....(108)	皂角.....(77)
桃仁.....(119)	絲瓜絡.....(171)
馬兜令.....(120)	女貞子.....(8)
牽牛子.....(136)	小茴香.....(7)
紫苏子.....(138)	梔子.....(153)
蛇床子.....(145)	花椒.....(95)
菟絲子.....(158)	木瓜.....(31)
	烏梅.....(131)
	蓮子.....(195)

蓮房	(195)
蓖麻子	(190)
鶴虱	(207)
山枸杞	(20)
苦丁香	(109)
路路通	(180)
白凡豆	(44)
蔥籽	(181)
黑芝麻	(166)
黑桑椹	(167)
香櫞	(112)
蘆芭子	(91)
冬葵子	(52)
天仙子	(28)
毛桃	(37)
茺蔚子	(133)
苦楝子	(109)
甜瓜子	(145)
金櫻子	(90)

花 类

紅花	(105)
款冬花	(160)
菊花	(161)
銀花	(193)
辛夷	(74)
芫花	(94)
扁豆花	(117)
夏枯草	(132)

密蒙花	(152)
旋复花	(152)
槐花	(188)
月季花	(30)
洋金花	(115)
葛花	(176)
鷄冠花	(174)
木槿花	(31)

叶 类

十大功劳	(7)
石葦	(49)
桑叶	(125)
淡竹叶	(147)
紫苏叶	(139)
側柏叶	(146)
荷叶	(146)
大青叶	(6)
芙蓉叶	(100)
銀杏叶	(194)
艾叶	(72)
薄荷	(198)

根与根茎类

山藥	(10)
天南星	(25)
白夫子	(41)
白前	(40)
菖蒲	(157)

威灵仙.....(101)	山豆根.....(15)
香附.....(113)	青木香.....(87)
黄精.....(164)	花粉(天花粉).....(96)
牛膝.....(34)	北沙参.....(55)
漏蘆.....(185)	半夏.....(53)
丹参.....(37)	山沙参.....(18)
天門冬.....(26)	苦参.....(111)
柴胡.....(103)	猫爪草.....(167)
桔梗.....(118)	知母.....(93)
黄芩.....(165)	墓头回.....(190)
葛根.....(175)	白薇.....(45)
蒼朮.....(186)	山胆草.....(19)
远志.....(183)	寻骨风.....(171)
白芷.....(41)	山大黄.....(16)
茜草.....(128)	天麻.....(27)
藜蘆.....(204)	生姜.....(60)
商陆.....(156)	白芨.....(46)
白茅根.....(48)	白头翁.....(47)
升麻.....(25)	白斂.....(45)
防风.....(75)	玉竹.....(61)
狼毒.....(129)	百合.....(69)
紅要子.....(107)	百部.....(69)
地榆.....(68)	光慈姑.....(71)
貫众.....(149)	何首烏.....(79)
三稜.....(2)	狗脊.....(98)
山天麻.....(17)	射干.....(129)
土貝母.....(4)	草烏.....(130)
蘆根.....(92)	

紫草.....(142)
細辛.....(155)
麥門冬.....(154)
獨活.....(102)
党參.....(131)

藤本类

青風藤.....(88)
通草.....(151)
鷄血藤.....(173)
桑寄生.....(127)
木通.....(30)
天仙藤.....(29)
金銀藤.....(90)
石楠藤.....(50)
夜交藤.....(82)

皮类

苦楝皮.....(110)
地骨皮.....(67)
石榴皮.....(51)
杜仲.....(79)
桑白皮.....(126)
白蘚皮.....(45)
五加皮.....(23)
秦皮.....(125)
紫荊皮.....(142)
黃柏.....(163)
冬瓜皮.....(52)

海桐皮(附丁皮).....(124)

草类

地丁.....(66)
荊芥.....(120)
蒲公英.....(188)
刘寄奴.....(192)
鵝不食草.....(204)
翻白草.....(203)
金釵.....(89)
豨薟草.....(190)
谷精草.....(76)
淫羊藿.....(150)
青蒿.....(88)
瞿麥.....(202)
茵陳.....(133)
蕭薷.....(181)
澤蘭.....(197)
紫蘇梗.....(140)
大薊.....(5)
小薊.....(7)
旱蓮草.....(77)
卷柏.....(99)
香附.....(113)
益母草.....(134)
透骨草.....(135)

矿物

琥珀	(159)
龙骨	(199)
赤石脂	(73)
代赭石	(54)
龙齿	(200)
石膏	(50)
土龙骨	(3)
阳起石	(169)
阴起石	(144)
磁石	(197)
芒硝	(75)
禹粮石	(116)
寒水石	(169)
硫黄	(168)
金蒙石	(91)

动物类

牛黄	(32)
全虫(蝎)	(61)
土元	(2)
五灵脂	(23)
夜明砂	(82)
刺猬皮	(83)
狗宝	(98)
红娘子	(107)
蜂房	(178)

蜈蚣	(179)
鸡肉金	(173)
豹骨	(123)
野猪皮	(144)
蚕沙	(208)
蛇蜕	(143)
上甲	(9)
蝉衣	(203)
蜂蜜	(177)
虻虫	(114)
水蛭	(29)
斑蝥	(170)
望月沙	(149)
地龙	(68)
麝香	(205)

加工品

淡豆豉	(148)
硼砂	(182)
青黛	(185)
干漆	(20)
阿胶	(84)
六神麴	(39)
百草霜	(70)
黄腊	(163)
紫河车	(140)
麦芽	(155)



S0022926

黄丹.....

竹茹.....(71)

柿蒂.....(100)

半夏麴.....(53)

木 本

皂角刺.....(78)

桑枝.....(127)

山川柳.....(18)

其 他

馬勃.....(136)

蒲黄.....(189)

紫稍花.....(141)

五倍子.....(22)

茯苓.....(121)

猪苓.....(150)

(111).....

(112).....

(113).....

(114).....

(115).....

(116).....

(117).....

(118).....

(119).....

(120).....

(121).....

(122).....

(123).....

(124).....

(125).....

(126).....

(127).....

(128).....

(129).....

(130).....

(131).....

(132).....

(133).....

(134).....

(135).....

(136).....

(137).....

(138).....

(139).....

(140).....

(141).....

(142).....

(143).....

(144).....

(145).....

(146).....

(147).....

66.91

312

1:

河南中藥手冊 2696
(第一冊)

田景全

田景全

1964.3.15

66.91

312

1:

2696

內 容 提 要

这本手册共介绍了二百七十二种常用的中藥，其中每种中藥均按照別名、产地、产地加工、商品規格、鑑別方法、用途、包裝 貯藏和其他項目，加以說明。为当前中藥整理、研究工作人員和植物学、生藥学、中藥教師工作中必要的参考書。

河南中藥手册(第一册)

河南省衛生厅藥品檢驗所編

河南人民出版社出版(郑州市行政区鯉五路)
河南省書刊出版業營業許可証出字第一号
地方國營洛陽印刷厂印刷 河南省新華書店發行

據总書号: 1736

787×1092 1/32 · 6 $\frac{15}{16}$ 印張 · 120,000 字

1959年3月第1版 1959年5月第2次印刷

印数: 5,088—13,108册

統一書号: 14105·40

定价: (10) 0.98元